Muller
Spicilége de
flore Bruxellois

QK
298
.M85
1862


5
PRO SCIENTIA
SALUTE
POPULIQUE
LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
Special Book Fund
1905
Septemb 1899
R W Gibson Invt

SPICILÉGE

DE

LA FLORE BRUXELLOISE,

PAR

FÉLIX MULLER,

Chevalier de l'Ordre de Léopold.

Président de la Société royale linnéenne de Bruxelles, conseiller de la Société royale de botanique de Belgique, secrétaire de la Commission de surveillance de l'Ecole d'horticulture de l'Etat à Vilvorde, membre honoraire de la Société royale pour l'encouragement de l'horticulture des Pays-Bas, de la Société horticole et agricole de Huy, de l'Académie d'horticulture de Gand, de la Société de botanique *Kruidkundig Genootschap* d'Anvers, de la Société agricole de Duffel, membre correspondant de la Société d'horticulture du royaume de Prusse, de la Société royale d'horticulture de Tournai, etc., etc., etc.

PREMIER ET DEUXIÈME FASCICULES.

BRUXELLES.

M. HAYEZ, IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE.

1864.

SPICILÉGE

DE

LA FLORE BRUXELLOISE.

Extrait des *Bulletins de la Société royale de botanique de Belgique*, tome Ier, nos 2 et 3.

SPICILÉGE

DE

LA FLORE BRUXELLOISE;

PAR

FÉLIX MULLER,

Président de la Société royale linnéenne de Bruxelles, conseiller de la Société royale de botanique de Belgique, secrétaire de la Commission de surveillance de l'École d'horticulture de l'État à Vilvorde, membre honoraire de la Société royale pour l'encouragement de l'horticulture des Pays-Bas, de la Société horticole et agricole de Huy, de l'Académie d'horticulture de Gand, de la Société de botanique *Kruidkundig Genootschap* d'Anvers, de la Société agricole de Duffel, membre correspondant de la Société d'horticulture du royaume de Prusse, de la Société royale d'horticulture de Tournai, etc., etc., etc.

PREMIER FASCICULE.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.

BRUXELLES,

M. HAYEZ, IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE.

1862.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.

SPICILÉGE

DE

LA FLORE BRUXELLOISE.

En publiant aujourd'hui ce spicilége, fruit de plusieurs années de recherches, je n'ai fait que céder aux instances de quelques-uns de mes amis. Je me proposais d'explorer, pendant quelques années encore, certaines localités délaissées par nos botanistes, et d'offrir alors un travail complet sur notre flore brabançonne; mais comme celle-ci s'enrichit tous les ans par des découvertes nouvelles, j'ai cru devoir faire paraître par fascicules le résultat de mes observations.

En jetant les yeux sur la partie de la carte du Brabant que je compte explorer, je m'aperçois qu'il me reste encore bien des localités à examiner. Dans les

14 1905

divers ouvrages qui traitent de la flore bruxelloise, les stations des plantes citées sont pour ainsi dire toujours les mêmes. La plupart de nos explorateurs dirigent leurs courses d'après un itinéraire déjà tracé; ils affluent dans des localités mille fois explorées, telles que Boitsfort, Groenendael, la Hulpe, Auderghem, etc., etc. Dans mes excursions presque journalières, j'ai trouvé aux portes de Bruxelles des plantes dont l'existence dans notre province était restée ignorée jusqu'à ce jour; cela se comprend : le plus grand nombre de nos herborisateurs quittent la capitale et traversent la banlieue au pas de course et ne s'arrêtent qu'à une grande distance de la ville : il leur semble que plus ils s'éloignent, plus les plantes seront dignes d'être récoltées.

La création de la Société royale de botanique de Belgique est un fait heureux, tant au point de vue du développement de la science proprement dite qu'à celui de l'horticulture elle-même. Il faut le reconnaître, jusqu'à ces derniers temps, nos sociétés horticoles s'occupaient trop exclusivement du côté récréatif de la culture et négligeaient beaucoup la partie scientifique du domaine de Flore. Cependant le jardinage est loin d'être étranger à la botanique; il en est, au contraire, l'intime allié et en quelque sorte le frère :

car le meilleur moyen de bien connaître les plantes, c'est de les cultiver, afin de les comparer entre elles à toutes les phases de leur existence.

Les sociétés horticoles présentent donc, dans les jeunes cultivateurs, d'excellents éléments pour former des botanistes; il suffit pour cela de les encourager et de leur donner une impulsion scientifique. Pénétré de ces idées, j'ai institué, dans la Société royale Linnéenne de Bruxelles, dont j'ai l'honneur d'être le président, des cours scientifiques et des herborisations, dans le but de créer une phalange de jeunes botanistes.

Les herborisations annoncées au commencement de l'année dans le programme des cours, ont lieu deux fois par mois, durant la belle saison. Elles sont dirigées par un professeur pris parmi nos honorables confrères : MM. Franqui, Piré, Grün, Wesmael, et le succès qu'elles ont obtenu portera, je l'espère, d'heureux fruits pour la science.

Bien de jeunes et belles intelligences travailleront à agrandir l'édifice, et chacun voudra y apporter sa pierre. J'ai l'espoir qu'un grand nombre de nos collègues étudieront avec soin la partie du pays qu'ils habitent, et que nous verrons un jour leurs travaux réunis en une flore générale de la Belgique, publiée

sous les auspices de la Société royale de botanique de Belgique.

Je n'entre point dans des détails sur la géologie des environs de Bruxelles, presque tous les auteurs des divers ouvrages qui traitent de notre flore ayant donné des renseignements très-exacts sur cette matière; je ne puis cependant me dispenser de faire remarquer combien il est utile aux botanistes de bien étudier la nature du sol qu'ils doivent parcourir.

Quand un botaniste ne parcourt qu'une partie assez restreinte du pays, il ne peut passer aucune localité sans la visiter avec le plus grand soin; si les espèces y sont moins nombreuses, il se peut qu'il en rencontre de très-précieuses et qui compensent largement ses courses laborieuses.

Le *Spicilége de la flore bruxelloise* comprend une région circonscrite dans un cercle de huit lieues dont Bruxelles est le centre. Dans ce cercle très-restreint, on est étonné de trouver une bien grande diversité de terrains. Je crois pouvoir certifier que cette partie de notre pays est loin d'avoir été entièrement ou consciencieusement explorée et qu'il reste encore beaucoup à glaner.

En communiquant le résultat de mes herborisations faites avec la section de botanique de la Société royale

Linnéenne et de mes herborisations particulières, j'ai cru devoir me borner à ne mentionner que les espèces les plus rares ou celles qui sont localisées dans les environs de Bruxelles. Plusieurs d'entre elles avaient déjà été indiquées dans d'autres parties du Brabant; mais comme elles n'avaient pas encore été signalées aux environs de la capitale, il m'a paru utile de les comprendre dans mon catalogue.

J'ai adopté la classification de M. Du Mortier, dans son *Analyse des familles des plantes*, ce savant devant publier sous peu un synopsis de la flore de la Belgique, qui, nous n'en doutons point, sera bientôt le *vade-mecum* de tous nos botanistes.

Je ne puis entrer en matière sans citer avec reconnaissance les noms des botanistes qui ont bien voulu me fournir des renseignements pour compléter mon travail. Ce sont MM. Du Mortier, le Rév. Bellynck, L. Piré, J.-B. Francqui, A. Wesmael, C. Grün, F. Baesen, J.-E. Bommer, A. Houzé, A. Boucher et H. Louis.

PREMIÈRE PARTIE.

ESPÈCES CRITIQUES.

Fam. 77. — CUSCUTACÉES Presl.

Cuscuta trifolii Babing.

J'ai remarqué deux formes très-différentes de Cuscutes, et qui méritent d'être signalées : l'une très-florifère et attaquant le trèfle en rond, de manière à laisser des vides circulaires dans les champs où se cultive cette plante; l'autre, au contraire, est peu florifère, s'étale sous les tiges des trèfles, et couvre la terre comme d'un réseau. Cette dernière ne grimpe presque pas sur les tiges. Serait-ce une espèce distincte?

J'ai rencontré fréquemment, cette année, la Cuscute sur le trèfle, la luzerne, le gênet et le houblon. J'attire l'attention des cultivateurs sur cette plante nuisible, qui semble envahir le Brabant.

Fam. 149. — LÉGUMINEUSES Adans.

Trib. 10. — Trifoliées.

Trifolium capillatum Dmrt., *Prodr.*, p. 101.

J'ai trouvé cette curieuse plante sur une terre inculte, puis sur les bords des fossés à Perck, près de Vilvorde, et en plusieurs autres endroits; elle avait été découverte par M. Du Mortier, à Juslenville. Comme cette espèce si rare n'avait pas été observée depuis environ quarante ans, j'ai cru devoir en donner une description détaillée.

Tiges diffuses, étalées et ascendantes, d'un pied environ de hauteur, rameuses dans le bas, munies de quelques poils dans leur partie supérieure; il y aura donc nécessité de modifier la diagnose sur ce point. Stipules brunâtres très-larges, fortement nerveuses, glabres, acuminées et cuspidées, terminées par quelques poils réunis en pinceau; feuilles ternées à folioles ovales, atténuées à la base et au sommet; presque glabres par-dessus, poilues par-dessous, d'une teinte grisâtre. Capitules terminaux presque sessiles globuleux, d'un vert grisâtre et comme chevelus. Fleurs roses très-pâles, beaucoup plus courtes que les dents des calices, qui sont capilliformes, beaucoup plus longues que les fleurs et hérissées de poils.

Fam. 202. — STELLARIACÉES Prod.

Trib. 3. — Alsinées.

Cerastium apetalum Dmrt., *Prodr.*, p. 8, et *Com. bot.*, p. 47.

Cette espèce est très-répandue dans les champs et les potagers, à Ixelles et à Saint-Josse-ten-Noode.

Bien que MM. Lejeune et Courtois, dans leur *Compendium*, aient rapporté cette plante comme variété du *Cerastium vulgatum*, elle constitue une espèce parfaitement distincte, et que l'on reconnaît au premier coup d'œil. L'absence de pétales et le nombre des étamines, qui est de cinq au lieu de dix, sont des caractères tranchés.

La plante ne varie pas par le semis, car M. Du Mortier m'a assuré l'avoir cultivée pendant plus de vingt années, sans que jamais elle eût subi la moindre modification.

Fam. 221. — FUMARIACÉES Juss.

Trib. 1. — Fumariées.

Fumaria micrantha Lagasca, *Cat. hort.* — Cosson et Germ., *Fl. paris.* — Dec., *Syst. vég.*

J'ai découvert cette belle espèce dans un champ sablonneux, à Saint-Gilles, près de Bruxelles; elle y croissait en grande abondance avec le *F. officinalis* et le *F. Vaillantii*.

Jusqu'ici, elle n'avait pas encore été trouvée en Bel-

gique. Elle se distingue facilement par ses sépales, égalant la moitié de la corolle et fortement dentées, par ses fleurs petites et en épi dense, par ses fruits arrondis au sommet, non bilobés, comme dans le *F. officinalis*, ni mucronés, comme dans le *F. parviflora*. Les pinules de ses feuilles sont linéaires et mucronées, ce qui la distingue du *F. densiflora*, trouvé par nous dans les dunes au nord d'Ostende, et qui a été trouvé par M. Piré à Mariakerke, et par M. Crepin à Nieuport.

Elle a été trouvée depuis à Uccle et à Forêt, par M. Piré et par M. Bommer.

Fam. 184. — HYPÉRICINÉES Juss.

Trib. 1. — Hypéricées.

Hypericum veronense Schrank.

Je dois la connaissance de cette belle espèce à M. Bommer, qui l'a trouvée à Dilbeek. Elle a déjà été indiquée en Belgique par M. Kickx, à Bincom, Meensel, Winghe-Saint-Georges et Hauwaert, ainsi que dans les environs de Trèves par M. Wirtgen.

Cette plante est remarquable par sa tige, qui est presque sous-ligneuse à la base, et se divise en un grand nombre de rameaux flexueux formant la pyramide. Elle diffère de l'*Hypericum perforatum* par ses sépales égaux à l'ovaire, et non deux fois plus longs que lui. Ses fleurs sont très-grandes et d'un beau jaune doré.

Fam. 214. — RENONCULACÉES Juss.

Trib. 2. — Anémonées.

Anemone Apennina L.

Je ne puis m'empêcher de mentionner cette belle et rare espèce indiquée par Dekin et Passy comme croissant aux environs de Bruxelles, *à Anderlecht, dans les buissons et le long du ruisseau.*

Les échantillons cueillis dans cette localité par Olislagers et conservés dans l'herbier de M. Du Mortier se bornent à indiquer Anderlecht, mais j'ai rencontré dans l'herbier de Nyst plusieurs spécimens de cette plante portant sur l'étiquette la phase suivante : *Collecta in Belgio Dylensi* (1) *1809 Lecrocq in Veuil* (2) *prope Anderlecht.* Cette curieuse indication servira, je l'espère, à faire retrouver cette précieuse espèce.

On se tromperait étrangement si l'on croyait que l'anémone des Apennins est une espèce alpine, car, en Italie, elle habite les plaines comme les hautes montagnes. En outre, elle se rencontre, dans le nord, en Hollande, aux environs de Leyde et de Vleuten, et en Angleterre sur plusieurs points. L'indigénat de cette rare espèce en Belgique n'a donc rien d'irrégulier : ce n'est qu'un fait de plus à ajouter à ses excentricités déjà constatées.

---

(1) Le département de la Dyle.

(2) En relisant l'étiquette écrite d'une manière peu lisible, je doute s'il ne faudrait pas lire *invenit.*

Fam. 220. — CRUCIFÈRES Juss.

Trib. 5. — Buniadées.

Bunias erucago L.

Cette espèce précieuse pour notre flore a été trouvée, par M. Piré, à Ixelles, dans un terrain inculte. Elle avait déjà été indiquée en Flandre par Van Hoorebeke, et la découverte de M. Piré prouve qu'il ne faut pas rejeter d'une façon trop absolue les indications de cet auteur.

Cette plante est commune dans la France centrale, et elle a été indiquée à Mantes, près de Paris.

DEUXIÈME PARTIE.

ÉNUMÉRATION SYSTÉMATIQUE.

Classe Ire. — JULOSÉPALES.

CONIFÈRES.

Pinus Lin.

Pinus strobus L. — ♄ Mai. Terrains sablonneux à Uccle (planté).
— *Pinaster* Ait. — ♄ Mai. Bois de sapin à Bonheyden et Waehlem.

MYRICÉES.

Myrica Lin.

Myrica Gale L. — ♄ Avril, mai. Environs de Wavre-Sainte-Catherine.

BÉTULACÉES.

Betula.

Betula pubescens Ehrh. — ♄ Avril, mai. Bois de Soigne.

SALICINÉES.

Salix Lin.

Salix acuminata Sm. — ♄ Avril. Lieux humides de la forêt de Soigne.

Classe II. — GYNOSÉPALES.

HIPPURIDÉES.

Hippuris Lin.

Hippuris vulgaris L. — ♃ Mai-août. Étangs à Sept-Fontaines (Houzé) et à Uccle (Rottenburg), Anderghem et Boitsfort (Bommer).

ARISTOLOCHIÉES.

Aristolochia Lin.

Aristolochia Clematitis L. — ♃ Juin-août. Dans une haie à Etterbeck.

Classe III. — TOROSÉPALES.

URTICINÉES.

Parietaria Lin.

Parietaria diffusa M. et K. — ♄ Juin-septembre. Sur les vieux murs des bords de la Senne près de la station du Midi, à Bruxelles.

ULMIDÉES.

Ulmus Lin.

Ulmus montana Sm. — ♄ Mars-avril. Le long des routes, à Jette, etc.
— *hollandica* Miller. — ♄ Mars. Planté le long des routes.

CHÉNOPODIACÉES.

Atriplex Lin.

Atriplex angustifolia Sm. — ① Juillet-septembre. Lieux incultes.
— *hortensis* L — ① Juillet, août. Dans les jardins, les potagers et sur les fumiers.

Chenopodium Lin.

Chenopodium viride L. — ① Juin-septembre. Les champs et les décombres.

— *ficifolium* Sm. — ① Août, septembre. Dans les champs.

ILLÉCÉBRINÉES.

Illecebrum Lin.

Illecebrum verticillatum L. — ♃ Juin-août. Chemins sablonneux à Duffel.

Herniaria Lin.

Herniaria glabra L. — ♃ Juillet, août. Bords des chemins à Laeken et à Bergh.

— *hirsuta* L. — ♃ Juillet, août. Champs sablonneux à Uccle et à Perck.

POLYGONÉES.

Polygonum Lin.

Polygonum Fagopyrum L. — ① Juillet, août. Cultivé dans les terrains sablonneux.

— *tataricum* L. — ① Juillet, août. Mêlé au *P. fagopyrum.*

— *nodosum* Pers. — ① Juillet-septembre. Bords des rivières.

— *dumetorum* L. — ① Juin-août. Molenbeek-St.-Jean et Etterbeek, dans les haies et les buissons (Bommer).

SANGUISORBÉES.

Poterium Lin.

Poterium Sanguisorba L. — ♃ Juin, Juillet. Coteaux secs à Forêt (Bommer).

Classe IV. — TOROCOROLLES.

LABIÉES.

Ajuga Lin.

Ajuga reptans L. var. fl. roseo. — ♃ Mai, juin. Bois à Auderghem.

Scutellaria Lin.

Scutellaria galericulata L. — ♃ Juin-août. Terres tourbeuses à Kesbeek (Forest).

Betonica Lin.

Betonica officinalis L. — ♃ Juin-août. Bords des chemins à Rouge-Cloître et Perck.

Galeopsis Lin.

Galeopsis dubia Leers. — ① Juillet, août. Bois de la Cambre.
— *versicolor* Curt. — ① Juillet, août. Champs près de Waelhem.

Leonurus Lin.

Leonurus canescens Dmrt. — ♃ Juin, août. Dans un terrain inculte à Etterbeek. Elle diffère du *L. cardiaca* par les poils courts qui la couvrent et qui lui donnent un aspect grisâtre. Elle a été reconnue par M. Du Mortier.

Nepeta Lin.

Nepeta cataria L. — ♃ Juin-août. Lisière du bois à la Hulpe et talus du chemin de fer à Boitsfort.

Mentha Lin.

Mentha pulegium L. — ♃ Juillet, août. Kickx, dans sa *Flora Bruxellensis*, l'indique à Saint-Gilles. Elle se trouvait en grande abondance sur un talus près du pont sous la chaussée de Waterloo. Aujourd'hui elle est presque complétement detruite.

LENTIBULARIÉES.

Utricularia Lin.

Utricularia vulgaris L. — ♃ Juillet-août. Étangs à Auderghem et Boitsfort.

— *minor* L. — ♃ Juin-juillet. Fossés à Bergh.

POLYGALÉES.

Polygala Lin.

Polygala depressa Wend. — ♃ Mai, juin. Bruyères à Saint-Job et Elewyt.

RHINANTHIDÉES.

Pedicularis Lin.

Pedicularis palustris L. — ♃ Mai-Juillet. Marécages à Bergh, Wachlem et Auderghem.

— *sylvatica* L. — ♃ Avril-juin. Bruyères à Saint-Job, Boitsfort.

Antirrhinum Lin.

Antirrhinum orontium L. — ① Juillet-septembre. Champs à Laeken, Droogenbosch, Uccle et Perck.

Kickxia Dmrt.

Kickxia elatine Dmrt. — ① Juillet-septembre. Champs à Saint-Job et à Perck. — *Linaria* Dec.

Rhinanthus.

Rhinanthus major Ehrh. — ① Mai, juin. Prairies humides à la Hulpe et dans les anciens étangs d'Etterbeek.

Veronica.

Veronica polita Fr. — ① Avril-juillet. Champs près du jardin Zoologique, berges à Woluwe-Saint-Pierre (Grün), Uccle (Piré).

— *obscura* Dmtr. — ① Mars-juin. Champs et jardins.

— *Buxbaumii* Ten. — ① Avril-juillet. Champs à Etterbeek.

Veronica triphyllos L. — ① Avril, mai. Champs à Ixelles, Saint-Gilles, Etterbeek et Laeken.

— *peregrina* L. — ① Mai, juin. Champs et jardins à Etterbeek et Saint-Gilles.

— *montana* L. — ♃ Mai-juin. Bois à Groenendael et à Auderghem.

Scrophularia Lin.

Scrophularia Ehrharti Stev. — ① Juin, juillet. Bords des chemins à Saint-Gilles et Rouge-Cloître.

VERBASCINÉES.

Verbascum Lin.

Verbascum phlomoides L. — ② Juin-août. Talus à Ganshoren et à Auderghem.

— *lychnitis* L. — ② Juin-août. Talus près de la Cambre.

— *nigrum* L. — ♃ Juin-août. Bords de la Senne à Forêt et à Hal.

— *blattaria* L. — ① Juin-août. Terrains secs à Ixelles et à Cureghem.

SOLANÉES.

Hyoscyamus Lin.

Hyoscyamus agrestis Kit. — ① Juin, juillet. Le long de la Senne à Laeken; à Wavre.

Atropa Lin.

Atropa Belladona L. — ♃ Juin-août. Lisière du bois à Groenendael.

Solanum Lin.

Solanum humile Berhn. — ① Juin-septembre. Terrain sablonneux à Saint-Gilles.

Lycium Lin.

Lycium barbarum L. — ♄ Juin-septembre. Haies à Ixelles.

BORACINÉES.

Omphalodes.

Omphalodes verna Moench. — ♃ Avril, mai. Trouvée par le Dr Georges, dans les bois et les prés humides près de Hal, et par M. Van Espen, ancien jardinier en chef au jardin Botanique de Bruxelles, dans les bois entre Haecht et Louvain.

Myosostis Lin.

Myosostis cœspitosa Schult. — ♃ Mai-septembre. Prairies autour de Bruxelles.

Cette belle espèce, confondue par tous les auteurs de la *Flore de Bruxelles* avec le *M. palustris*, en diffère entièrement par ses tiges cespiteuses et non rampantes. Rare partout ailleurs, elle est tellement abondante autour de Bruxelles que chaque jour on en apporte des bouquets en quantité sur les marchés de la capitale.

Lithospermum Lin.

Lithospermum officinale L. — ♃ Mai-juillet. Prés des étangs de Rouge-Cloître et à Forêt.

Pulmonaria Lin.

Pulmonaria officinalis L. — ♃ Mars-mai. Sur un talus à Uccle.

CONVOLVULACÉES.

Cuscuta Lin.

Cuscuta trifolii Babing. — ① Juin-août. Champs à Ixelles et à Perck.

PLANTAGINÉES.

Plantago Lin.

Plantago Coronopus L. — ♃ Juin-août. Terrain sablonneux à Muyssen.

LITTORELLA Lin.

Littorella lacustris L. — ♃ Mai-juillet. Bords d'un étang à Bonheyden.

GENTIANÉES.

GENTIANA Lin.

Gentiana pneumonanthe L. — ♃ Août, septembre. Prairies inondées près de Wachlem.

ERYTHRÆA Pers.

Erythræa pulchella Fries. — ① Chemin humide à Molenbeek-Saint-Jean (Bommer).

CICENDIA Adans.

Cicendia filiformis, Durt. — ① Bruyères de Bonheyden.

MENYANTHES Lin.

Menyanthes trifoliata, L. — ♃ Mai, juin. Prairies tourbeuses près de la Hulpe.

LIMNANTHEMUM Gmel.

Limnanthemum nymphoides, Gmel. — ♃ Juin-août. Dans le canal près de Vilvorde et Malines.

PRIMULACÉES.

CENTUNCULUS Lin.

Centunculus minimus L. — ① Juin-juillet. Champs à Ohain (Houzé et Grün), Etterbeek et Gaesbeek (Boucher et Grün).

ANAGALLIS Lin.

Anagallis tenella L. — ♃ Juin-août. Dans les marécages à Bergh (A. Wesmael).

— *carnea* Schrank. — ① Juin-septembre. Champs sablonneux près de Malines.

Cette plante est représentée par plusieurs

botanistes comme étant une variété de l'*A. arvensis* L. Cependant elle persiste par la culture. En outre, sa capsule ne s'ouvre pas à la maturité, comme dans l'*A. arvensis*, mais elle reste toujours close. Ce caractère, joint à sa persistance, me paraît suffisant pour la considérer comme une espèce distincte.

Classe V. — GYNOCOROLLES.

CAMPANULACÉES.

Phyteuma Lin.

Phyteuma nigrum Schm. — ♃ Mai, juin. Bois de la Cambre.

Cette belle plante a été indiquée par M. Crepin, dans son *Manuel de la flore de la Belgique*, et par MM. Van Heurck et Wesmael, d'après M. Scheidweiler, sous le nom de *Phyteuma orbiculare* Lin.

Le véritable *Ph. orbiculare* de Linné est une plante entièrement différente et dont l'épi reste globuleux; je la cultive dans mon jardin, où j'ai eu l'occasion de l'observer depuis vingt ans. Elle résiste difficilement à notre climat, et notre sol ne lui est pas favorable. Les différents échantillons du *Ph. nigrum* Schm., récoltés dans le bois de la Cambre, prospèrent dans nos jardins, et j'ai toujours observé que son épi s'allonge et devient cylindrique en fleurissant. L'herbier de feu Nyst contient un échantillon authentique du *Ph. orbiculare*, mais provenant d'une plante cultivée.

SYNANTHÉRÉES.

Crepis Lin.

Crepis paludosa Moench. — ♃ Juin-août. Près des anciens étangs d'Etterbeek.

Helminthia Gaertn.

Helminthia echioïdes Gaertn. var. β *mollis*, Duby. — ① Juillet, août. Champs à Saint-Gilles (Pirè).

Hieracium Lin.

Hieracium auricula L. — ♃ Mai-juillet. Lieux boisés : la Cambre et Houthem.

Arnoseris Gaertn.

Arnoseris minima Gaertn. — ① Juin, juillet. Ixelles, Vivier d'Oye, Elewyt, la Hulpe, Saint-Gilles et Watermael.

Senecio Lin.

Senecio paludosus L. — ♃ Juin-août. Prairies de Monplaisir.
— *aquaticus* Sm. — ♃ Juin-août. Environs de Malines.

Hypochæris.

Hypochæris glabra L. — ① Juin-août. Champs près de Saint-Job.

Inula Lin.

Inula conyza L. — ② Juillet-septembre. Buissons à Saint-Gilles et Watermael, etc.

Filago Lin.

Filago germanica L. — ① Juin-août. Lieux sablonneux à Auderghem, Rouge-Cloître, Genval, Beersel et Linkebeek.
— *apiculata* Sm. — ① Juin-août. Lieux sablonneux à Auderghem et Linkebeek.

Antennaria Gaertn.

Antennaria dioica Gaertn. — ♃ Mai-juillet. Bois près de la Hulpe.

Helichrysum.

Helichrysum margaritaceum B. et F. — ♃ Juillet, août. Lisière du bois près de la Hulpe.

Gnaphalium Lin.

Gnaphalium luteo-album L. — ① Juillet, août. Berges près de la Petite-Ile.

Carlina Lin.

Carlina vulgaris L. — ② Juillet, août. Talus secs à Saint-Gilles.

Centaurea Lin.

Centaurea pratensis Thuill. — ♃ Juillet, août. Prairies à Forêt (Grün).
— *scabiosa* L. — ♃ Juin-septembre. Coteaux secs à Schaerbeek, route d'Haecht.

Lappa.

Lappa major Gaertn. — ② Juillet, août. Lieux incultes près de Dilbeek (Grün).
— *nemorosa* Dmrt. inéd. — ② Juillet, août. Cette plante n'est pas rare dans la forêt de Soigne.

Cirsium.

Cirsium nemorale Rchb. — ② Juin-septembre. Bois de la Cambre.
— *dubium* Wild. — ♃ Juin-août. Berges à Uccle.
— *oleraceo-palustre* Naeg. — ♃ Juin-août. Chemins à Saint-Gilles.

VALÉRIANACÉES.

Valeriana Lin.

Valeriana dioica L. — ♃ Mai, juin. Bois à Ganshoren.

Classe VI. — GYNOPÉTALES.

LORANTHIDÉES.

Viscum Lin.

Viscum album L. — ♄ Mars-mai. Parasite sur le pommier à Linkebeek et à Uccle.

OMBELLIFÈRES.

Conium Lin.

Conium maculatum L. — ♃ Juillet, août. Bords des champs à Wavre (Bommer).

Oenanthe Lin.

Oenanthe fistulosa L. — ♃ Juin, juillet. Prairies inondées près de la station du Nord.

Helosciadium Koch.

Helosciadium inundatum Koch. — ♃ Mai-juillet. Fossés peu profonds près de Waelhem.

Peucedanum Lin.

Peucedanum Chabraei Gaud. — ♃ Juillet, août. Prairies à la Hulpe (Bommer).

Anthriscus.

Anthriscus vulgaris Pers. — ♃ Avril, mai. Terrains sablonneux près de Bruxelles.

Selinum.

Selinum curvifolia L. — ♂ Juin, juillet. Dans les terrains incultes à Bergh.

Torilis.

Torilis infesta Duby. — ♂ Juillet, août. Champs à Uccle (Bommer).

Classe VII. — CALYPÉTALES.

SAXIFRAGÉES.

Chrysosplenium Lin.

Chrysosplenium oppositifolium L. — ♃ Avril, mai. Prairies tourbeuses à Uccle.

— *alternifolium* L. — ♃ Avril, mai. Cette plante est moins abondante dans cette localité que la première.

Saxifraga Lin.

Saxifraga granulata L. — ♃ Mai, juin. Prairie humide à Laeken.

— *tridactylites* L. — ① Juin, juillet. Coteaux secs à Saint-Gilles.

PORTULACÉES.

Claytonia.

Claytonia perfoliata Wild. — ① Juin, juillet. Subspontané dans les champs à Forêt et à Stalle (Grün).

EUPHORBIACÉES.

Euphorbia Lin.

Euphorbia dulcis L. — ♃ Mai, juin. Champs à Grimberghe (Wesmael).

— *cyparissias* L. — ♃ Mai-juillet. Bords d'un chemin à Bergh.

— *exigua* L. — ① Juillet, septembre. Champs autour de Bruxelles.

ONAGRARIÉES.

Epilobium Lin.

Epilobium hirsutum L. — ♃ Juillet, août. Bords des ruisseaux à Rouge-Cloître et à Ruysbroeck.

Oenothera Lin.

Oenothera biennis L. — ② Juin-août. Champs secs à Uccle et à Forêt.

TRAPACÉES.

Trapa Lin.

Trapa natans L. — ① Juin, juillet. Cette curieuse espèce, autrefois indiquée par M. Kickx dans les fossés de l'abbaye de Forêt, et par M. Scheidweiler dans les étangs de Rouge-Cloître, a été trouvée par mon honorable ami, M. Rottenburg, dans les étangs entre Auderghem et Woluwe-Saint-Lambert.

Myriophyllum.

Myriophyllum verticillatum L. var. *pectinatum* — ♃ Juillet, août. Fossés de Saint-Gilles (Grün).

LYTHRARIÉES.

Peplis Lin.

Peplis portula L. — ⓓ Juin-août. Bords des fossés des environs de Waehlem.

ROSACÉES.

Prunus Lin.

Prunus insititia L. — ♄ Mai. Dans les haies.

Pyrus Lin.

Pyrus malus L. — ♄ Haies et buissons.
— *communis* L. — ♄ Mai. Dans les bois à la Hulpe (Bommer).

Mespilus Lin.

Mespilus germanica L. — ♄ Mai. Taillis à la Hulpe, Genval, etc. (Bommer).

Cratægus Lin.

Cratægus monogyna Jacq. — ♄ Mai. Haies à Gansboren.

Rosa Lin.

Rosa tomentosa Sm. — ♄ Juin. Coteaux secs à la lisière du bois à Auderghem.
— *pomifera* Herm. — ♄ Juin. Dans les haies à Bonheyden.
— *glaucescens* Desf. — ♄ Juin. Dans une haie à Etterbeek.

Fragaria Lin.

Fragaria magna Thuill. — ♃ Mai, juin. Dans les bois de Ganshoren et de Linthout.

Potentilla Lin.

Potentilla argentea L. — ♃ Mai-août. Terres sablonneuses à Uccle.
— *recta* L. — ♃ Juin, juillet. Talus du chemin de fer du Luxembourg à Watermael (Boucher).

Comarum Lin.

Comarum palustre L. — ♃ Juin, juillet. Marécages près de Bonheyden.

LÉGUMINEUSES.

Genista Lin.

Genista anglica L. — ♃ Mai, juin. Sables à la Hulpe et Bonheyden.

Medicago Lin.

Medicago falcata L. — ♃ Juin-août. Près de la barrière de Saint Gilles.
— *falcato-sativa* Wsg. — ♃ Juin-août. Prairies près de Rouge-Cloître (Grün).
— *maculata* Willd. — ① Mai-août. A Saint-Gilles, près du cimetière, à Ixelles, près de la Cambre, et à Paepsem, près du moulin à écorces.
— *denticulata* Willd. — ① Mai-septembre. Au pied du mur du dépôt de la Cambre, du côté de l'avenue. Très-abondante. J'ai trouvé cette espèce pour la première fois dans le Brabant, au mois de septembre dernier, en herborisant avec le Rev. P. Bellynck.

Aux caractères que les botanistes assignent

à cette plante, j'ajouterai que, dans le *M. denticulata*, l'involution inférieure du légume, au lieu d'être couverte d'aiguillons, est entièrement nue du côté de l'attache du pédoncule. Ce caractère suffit pour le distinguer au premier coup d'œil du *M. maculata*.

Trifolium Lin.

Trifolium medium L. — ♃ Mai-juillet. Chemins creux à Forêt.
— *capillatum* Dmtr. — ♃ Mai-juillet. Bords des chemins, champs incultes.
— *hybridum* L. — ♃ Juin-août. Chemins près de Perck, et à la Hulpe (Houzé et Grün).
— *montanum* L. — ♃ Mai-juillet. Coteau sec près de la Hulpe.
— *elegans* Sav. — ♃ Mai-août. Prairies humides à Perck (Du Mortier).
— *fragiferum* L. — ♃ Juin-août. Bords des chemins à Perck et à Bergh.

Astragalus Lin.

Astragalus glycyphyllos L. — ♃ Juin, juillet. Talus du bois de M. Mosselman à Forêt.

Lathyrus Lin.

Lathyrus Nissolia L. — ① Mai-juillet. Champs à Saint-Gilles et Lacken.
— *sylvestris* L. — ♃ Juillet, août. Talus du bois de M. Mosselman à Forêt.
— *aphaca* L. — ① Mai-août. Bords des champs, Ixelles (M. le conseiller Defacqz).

Orobus Lin.

Orobus tuberosus L. — ♃ Mai, juin. Bois de la Cambre.

Vicia Lin.

Vicia tenuifolia Roth. — ♃ Juin-août. Buissons à Uccle (Bommer).

Classe VIII. — TOROPÉTALES.

OXALIDÉES.

Oxalis Lin.

Oxalis corniculata L. — ⊥ Juin-septembre. Dans les jardins et les potagers, peu connue.

BALSAMINÉES.

Impatiens Lin.

Impatiens noli tangere L. — ⊥ Juillet, août. Bois à Waelhem et Hoeylaert.

GÉRANIACÉES.

Geranium Lin.

Geranium columbinum L. — ① Juin-août. Berges à Schaerbeek et à Saint-Gilles.

LINIDÉES.

Radiola.

Radiola linoides Gmel. — ⊥ Juillet, août. Champs à Ohain (Houzé et Grün).

MALVACÉES.

Malva Lin.

Malva alcea L. — ♃ Juin-septembre. Bois de Tervueren (Grün).
— *moschata* L. — ♃ Juin-septembre. Bois et environs de Tervueren et de Groenendael.

TILIACÉES.

Tilia Lin.

Tilia parvifolia Rchb. — ♄ Juillet. Bois près de Loupoigne (Dandois).

HYPERICINÉES.

Hypericum Lin.

Hypericum veronense Schrk. — ♃ Juillet, août. Lieux herbeux à Dilbeek (Bommer).

— *hirsutum* L. — ♃ Juin-août. Bois humides à Groenendael.

— *montanum* L. — ♃ Juillet-août. Cette espèce, bien rare dans le Brabant, a été trouvée par mon ami, M. Bommer, dans une de nos excursions à Forêt; elle croît sur un talus assez élevé près du bois. Elle y est peu abondante.

MONOTROPÉES.

Monotropa Lin.

Monotropa hypopitys L. — ♃ Juin, juillet. Bois de sapins près d'Auderghem.

— *hypophegea* Wallr. — ♃ Juillet, août. Bois près de la Hulpe.

PYROLACÉES.

Pyrola Lin.

Pyrola minor L. — ♃ Mai-juillet. Bois de la Cambre.

STELLARIACÉES.

Dianthus Lin.

Dianthus prolifer L. — ① Juin-août. Coteaux secs à Saint-Gilles, Stalle et Uccle.

— *armeria* L. — ① Juillet, août. Talus à Anderlecht, Rouge-Cloître et Gaesbeek.

Cerastium Lin.

Cerastium apetalum Dmtr. — ① Mars-juin. Dans les champs sablonneux.

Stellaria Lin.

Stellaria glauca With. — ♃ Juin, juillet. Au bord des ruisseaux près de Malines.

Larbræa Saint-Hill.

Larbræa aquatica Saint-Hill. — ♃ Mai, juin. Lieux humides à Forêt et à Groenendael.

Sagina Lin.

Sagina depressa Schultz. — ① Juin, juillet. Loupoigne, moissons (Dandois).

Buda Adanson.

Buda rubra Dmrt. — ① Juin-août Champs à Jette, Gaesbeek et Itterbeek (Houzé et Grün). — *Arenaria* L.

Delia Dmrt.

Delia segetalis Dmrt. — ① Mai, juin. Bords des chemins à Uccle (Piré).

Spergula Lin.

Spergula maxima Weihe. — ① Juin, juillet. Champs de lin.
— *Morissoni* Bor. — ① Juin-août. Terrains sablonneux à Muyssen.

RÉSÉDACÉES.

Reseda Lin.

Reseda luteola L. — ② Juin-août. Champs et bords des chemins à Bergh, à Ganshoren et à Saint-Gilles. La graine du trèfle contient souvent un mélange de la graine du *R. luteola*.
— *lutea* L. — ♃ Juin-septembre. J'ai rencontré pour la première fois cette espèce dans les environs de Bruxelles au mois de septembre dernier. Elle croissait sur le talus du chemin derrière la Petite-Ile.

DROSÉRACÉES.

Drosera Lin.

Drosera rotundifolia L. — ♃ Juin-août. Prairies humides près de la Hulpe.
— *intermedia* Hayn. — ♃ Juillet, août. Prairies humides près de Waehlem.

VIOLACÉES.

Viola Lin.

Viola palustris L. — ♃ Avril-juin. Marais à Bergh.
— *hirta* L. — ♃ Avril, mai. Cette espèce, fort rare dans nos environs, nous a été indiquée par M. le professeur A. Wesmael, dans une de nos herborisations à Muysen.

RANUNCULACÉES.

Thalictrum Lin.

Thalictrum flavum L. — ♃ Juin, juillet. Très-abondant dans les marécages à Bergh.
— *flavum* var. *nigrum*. — ♃ Juin, juillet. Croît avec la première (A. Wesmael).

Anemone Lin.

Anemone ranunculoides L. — ♃ Avril, mai. Elle se trouve en grande abondance sur les bords d'un ruisseau près d'Anderlecht.

Ranunculus Lin.

Ranunculus lingua L. — ♃ Juin, août. Prairies inondées près de la Nèthe, à Waelhem.
— *auricomus* L. — ♃ Avril-juin. Endroits humides à Uccle et à la Hulpe.
— *Drouetti* Schultz. — ♃ Juin, juillet. Fossés des environs de Vilvorde (Grün).

Ranunculus ololeucos Lloyd. — ♃ Juillet, août. Fossés des sapinières à Elewyt (Grün).

— *divaricatus* Schrk. — ♃ Juin, juillet. Fossés à Saint-Gilles (Piré) et à Rouge-Cloître (Grün).

— *trichophyllus* Chaix. — ♃ Mai-août. Fossés autour de Bruxelles.

HELLEBORUS Lin.

Helleborus niger L. — ♃ Janvier, février. Cette belle espèce, décrite dans la *Flora Bruxellensis* de Kickx, et dans *Dekin et Passy*, m'a été indiquée par M. Rottenburg; elle se trouvait à la lisière du bois sur la route de Bruxelles à Tervueren. M. Kickx fils, m'a assuré l'avoir trouvée dans la même localité.

— *viridis* L. — ♃ Mars-mai. J'ai trouvé pour la première fois cette plante, il y a dix ans, dans un verger à Linkebeek; elle y croît en grande abondance.

DELPHINIUM Lin.

Delphinium consolida L. — ① Juin, juillet. Champs à Saint-Gilles, Schaerbeek et Woluwe.

CRUCIFÈRES.

LEPIDIUM Lin.

Lepidium draba L. — ♃ Mai-août. Bords du canal de Charleroi, entre Hal et Lembecq, vers la traversée du chemin de fer (Dr Georges).

— *campestre* L. — ① Mai-août. Berges à Molenbeek et à Grand-Bigard (Bommer).

— *sativum* L. — ① Mai-août. Champs sablonneux à Saint-Gilles.

LUNARIA Lin.

Lunaria biennis Moench. — ② Avril-juin. Clairière à Groenendael.

THLASPI Lin.

Thlaspi perfoliatum L. — ① Avril, mai. Bois d'Hez, près Loupoigne (Dandois).

Alyssum Lin.

Alyssum incanum L. — ♃ Mai-septembre. Très-abondant dans les environs de Malines.

Bunias Lin.

Bunias Erucago L. — ② Juin, juillet. Terrains vagues à Ixelles (Piré).

Barbarea.

Barbarea vulgaris Rich. — ♃ Mai-août. Berges à Forêt et à Saint-Job.
— *intermedia* Bor. — ♃ Mai-juillet. Forêt, Boitsfort.

Hesperis Lin.

Hesperis matronalis L. — ♃ Mai, juin. Près de l'abbaye de Groenendael et à la Hulpe.

Nasturtium.

Nasturtium microphyllum Rchb. — ♃ Mai-août. Dans les eaux vives.

Sisymbrium.

Sisymbrium sophia L. — ① Juin-août. Sur le talus d'un chemin près de Monplaisir.

Cardamine Lin.

Cardamine sylvatica Link. — ① Avril, mai. Lieux herbeux à Ixelles, à Forêt et à Vilvorde.
— *amara* L. — ♃ Avril, mai. Ruisseaux peu profonds et prairies inondées à Ruysbroeck, près du canal, à Laeken et à Saint-Job.

FUMARIACÉES.

Fumaria Lin.

Fumaria capreolata L. — ① Juin, juillet. Dans les champs et les jardins de Vilvorde et de Perck. Très-abondante à Tervueren.
— *Vaillantii* Lois. — Juin, juillet. Champs à Saint-Gilles, Uccle et Boitsfort.

Fumaria micrantha Lag. — ① Juillet, août. Champs sablonneux à Saint-Gilles, près du tir, à Uccle et à Forêt.

CORYDALIS Dmrt.

Corydalis lutea Pers. — ♃ Avril-octobre. Sur des murs humides à Veeweyde, et sur les vieux murs le long des rivières à Malines.

— *claviculata.* — ① Juin-août. Bruyères à Bonheyden (Piré).

CAPNITES Dmrt.

Capnites digitata Dmtr. — ♃ Avril, mai. Coteaux sablonneux à Uccle et à Beersel.

CLASSE X. — CALYTÉPALES.

HYDROCHARIDÉES.

STRATIOTES Lin.

Stratiotes aloides L. — ♃ Juin-août. Se trouve en grande abondance dans les marais et les fossés des environs de Malines.

ALISMACÉES.

ALISMA Lin.

Alisma lanceolatum With. — ♃ Juin-août. Croît dans les fossés le long de la route de Malines à Waehlem.

— *ranunculoides* L. — ♃ Juin-août. Dans les fossés et les ruisseaux à Bergh.

— *natans* L. — ♃ Juin-août. Fossés à Bergh.

CLASSE XI. — GYNOTÉPALES.

ORCHIDÉES.

ORCHIS Rich.

Orchis morio L. — ♃ Avril, mai. Bords d'un chemin à Linkebeek et à Uccle. Prairies à Forest.

Ophrys Rich.

Ophrys myodes Jacq. — ♃ Mai, juin. Dans les bois de la Cambre et de Laerbeek.

Gymnadenia Rich.

Gymnadenia conopsea R. Br. — ♃ Mai-juillet. Terrain marécageux à Bergh, à Lovenjoul, près de Louvain (Piré).

— *viridis* Rich. — ♃ Juin, juillet. Prairies humides à la Hulpe.

Platanthera Rich.

Platanthera bifolia Rich. — ♃ Mai-juillet. Bois de Laerbeek, à Gansoren, Saint-Job, Linthout.

Neottia Rich.

Neottia nidus avis Rich. — ♃ Mai, juin. Dans les bois de Groenendael et de Laerbeek.

Liparis.

Liparis Loeselii Rich. — ♃ Juillet, août. Cette espèce, encore bien peu connue en Belgique, a été trouvée par M. A. Wesmael à Bergh; il a bien voulu nous donner l'indication de cette localité. Elle croît dans un terrain marécageux.

Epipactis.

Epipactis palustris Sw. — ♃ Juin, juillet. Très-abondante dans les marécages de Bergh.

Classe XII. — GYNOCHLAMYDÉES.

IRIDÉES.

Iris Lin.

Iris Siberica L. — ♃ Mai, juin. Cette plante nous a été indiquée par feu le Dr Georges, qui l'a trouvée entre Hal et Lembecq, aux bords d'un étang, vers la traversée du chemin de fer. Je ne crois pas à la spontanéité de cette plante.

LEUCOIDÉES.

Galanthus Lin.

Galanthus nivalis L. — ♃ Mars, avril. J'ai trouvé cette charmante plante, il y a dix ans, à Linkebeek; depuis cette époque, elle m'a été indiquée comme croissant en grande abondance dans une prairie de la même commune.

Leucoium Lin.

Leucoium æstivum L. — ♃ Mai. Je dois la découverte de cette plante à feu M. le chevalier John De Knyff, de Wachlem, notre regretté collègue. Elle croît en grande abondance dans les prairies et sur les bords de la grande Nèthe près de Wachlem. Quoiqu'elle ne soit pas mentionnée par nos botanistes, l'indigénat de cette espèce n'est pas douteux.

DIOSCORÉES.

Tamus Lin.

Tamus communis L. — ♃ Mai, juin. On le rencontre fréquemment dans le bois de Laerbeek (Ganshoren) et à Rouge-Cloître.

Classe XIII. — TOROCHLAMYDÉES.

ASPARAGINÉES.

Asparagus Lin.

Asparagus officinalis L. — ♃ Juin-août. J'ai observé cette plante depuis Saint-Gilles jusqu'à Forêt, sur les coteaux secs et sablonneux, et le long du talus qui forme la lisière du bois de Forêt. M. Grün l'indique à Rouge-Cloître.

LILIACÉES.

Fritillaria Lin.

Fritillaria Meleagris L. — ♃ Mars, avril. Nous nous sommes rendus, au mois de mai dernier, dans une prairie hors de l'ancienne porte du Rivage, à gauche du canal, et nous avons pu constater la présence de cette charmante plante; elle varie du blanc au pourpre foncé. L'absence d'habitations et de jardins nous fait croire à la spontanéité de cette espèce. Elle se trouve, dans plusieurs localités de la Hollande, dans les mêmes conditions qu'ici. Elle m'a aussi été indiquée comme croissant à Beersel et à Delbeek.

Tulipa Lin.

Tulipa sylvestris L. — ♃ Avril, mai. Cette jolie plante se rencontre dans un petit bois près de Waehlem; Mlle Zoé De Knyff a bien voulu, il y a quelques années, nous indiquer cette localité.

Gagea Salisb.

Gagea arvensis Schult. — ♃ Avril, mai. Champs près de Perck (A. Wesmael).

— *spathacea* Schult. — ♃ Avril, mai. Trouvé, il y a quelques années, par M. Bommer dans la forêt de Soigne; elle

a, depuis cette époque, été observée par M. Pire dans le bois de la Cambre.

ALLIUM Lin.

Allium vinale L. — ♃ Juin, juillet. Chemins creux à Uccle et à Molenbeek-Saint-Jean.

— *ursinum* L. — ♃ Mai, juin. Buissons à la Hulpe et à Ganshoren.

MUSCARI Tourn.

Muscari botryoides Mill — ♃ Mars, avril. Dans un verger à Jette; près de l'avenue de Ste-Anne à Laeken; champs près Wachlem.

TRIGLOCHINÉES.

TRIGLOCHIN Lin.

Triglochin palustre L. — ♃ Juin-août. Marécages et prairies inondées à Anderlecht, Boitsfort et à Bergh.

JONCINÉES.

JUNCUS Lin.

Juncus squarrosus L. — ♃ Juin-août. Lieux sablonneux à Elewyt.

— *glaucus* Ehrh. — ♃ Juin, juillet. Bruyères humides près de Malines et à Anderlecht.

CLASSE XIV. — ACHNOSPATHÉES.

GRAMINÉES.

ARRHENATHERUM Beauv.

Arrhenatherum bulbosum Presl. — ♃ Mai-août. Prairies à Saint-Gilles.

LOLIUM Lin.

Lolium italicum Braun. — ♃ Juin-août. Bords des chemins à Boitsfort.

POA Lin.

Poa fertilis Host. — ♃ Juin-septembre. Prés humides.

Festuca Lin.

Festuca dariuscula L. var. *glauca*. — ♃ Mai-juillet. Prairies à Elewyt (Grün).

Bromus Lin.

Bromus brevisetus Dmtr. — ⊙ Juin, juillet. Champs entre Rouge-Cloître et Boitsfort.

Avena Lin.

Avena orientalis Schreb. — ⊙ Juillet, août. Souvent cultivée.
— *strigosa* Schreb. — ⊙ Juillet, août. Dans les champs d'avoine.

Triticum Lin.

Triticum caninum L. — ♃ Juin, juillet. Haies à Jette-Saint-Pierre.

Hordeum Lin.

Hordeum secalinum Schreb. — ♃ Juin, juillet. Prairies de Saint-Gilles et de Forêt.

CYPÉRINÉES.

Scirpus Lin.

Scirpus lacustris L. — ♃ Juin, juillet. Étang de la Hulpe.
— *Taberuæmontani* Gmel. — ♃ Juin, juillet. Fossés près de Perck.

Cladium R. Br.

Cladium mariscus R. Br. — ♃ Juin-août. Marais à Bergh.

Schoenus Lin.

Schoenus nigricans L. — Mai-juillet. Fossés près de Perck.

Carex Lin.

Carex digitata L. — ♃ Avril, mai. Environs de Bruxelles (Scheidweiler).
— *stellulata* Good. — ♃ Avril, mai Prairies spongieuses près de Forêt.
— *leporina* L. — ♃ Mai, juin. Hauthem, Saint-Job (Bommer). Boitsfort.

Carex sylvatica Huds. — ♃ Mai-juillet. Bois de la Cambre, Hoeylaert et Jette.

— *pilulifera* L. — ♃ Mai-juin. Saint-Job, la Hulpe (Piré) et Elewyt (Grün).

HELEOCHARIS R. Br.

Heleocharis acicularis R. Br. — ♃ Juin, juillet. Étangs de Hoeylaert.

CLASSE XV. — SPADICÉES.

AROIDÉES.

CALLA Lin.

Calla palustris L. — ♃ Juin-août. Fossés près de Waehlem et marais à Willebroeck.

POTAMOGÉTONÉES.

POTAMOGETON Lin.

Potamogeton plantagineus Cr. — ♃ Juillet, août. Ruisseau à Perck (Wesmael).

— *pusillus* Lin. — ♃ Juin-août. Fossés à la Hulpe.

LEMNACÉES.

LEMNA Lin.

Lemna polyrhiza L. — ⓣ Juin, juillet. Dans le canal de Charleroi et dans les fossés à Saint-Gilles.

— *gibba* L. — ⓣ Juin-juillet. Canal de Charleroi et à Saint-Gilles.

— *arhiza* L. — ⓣ Juillet-octobre. Dans le canal entre Laeken et Vilvorde.

Classe XVI. — DERMOGYNES.

ÉQUISÉTACÉES.

Equisetum Lin.

Equisetum hyemale L. — ♃ Juillet, août. Terres sablonneuses à Laeken et à Auderghem.

LYCOPODINÉES.

Lycopodium Lin.

Lycopodium clavatum L. — ♃ Juillet, août. Bois entre Groenendael et Boitsfort.

— *inundatum* L. — ♃ Juin, juillet. Bruyères inondées près de Waelhem.

OPHIOGLOSSINÉES.

Ophioglossum Lin.

Ophioglossum vulgatum L. — ♃ Mai, juin. Prairies à Auderghem.

FOUGÈRES.

Osmunda Lin.

Osmunda regalis L. — ♃ Mai, juin. Bois de sapins près de Waelhem.

Polystichum Rotte.

Polystichum oreopteris D. C. — ♃ Juillet-septembre. Fond humide à Boitsfort.

Aspidium R. Br.

Aspidium aculeatum Sw. — ♃ Juillet-octobre. Talus secs à Saint-Job et à Uccle.

— *aculeatum* var. *lobatum*, Sw. — ♃ Juillet-octobre. Chemin creux à Dilbeek.

SCOLOPENDRIUM Lin.

Scolopendrium officinale L. — ♃ Juillet-novembre. Talus à Linkebeek et murs humides à Waehlem.

POLYPODIUM Lin.

Polypodium phegopteris L. — ♃ Juillet, août Sur un coteau à Groenendael.

— *dryopteris* L. — ♃ Juillet-septembre. Bois près de la Hulpe et de Groenendael.

DEUXIÈME FASCICULE.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.

SPICILÉGE

DE

LA FLORE BRUXELLOISE.

Depuis la publication du premier fascicule de mon spicilége de la flore bruxelloise, je me suis occupé de compléter mon travail en parcourant des localités inexplorées jusqu'alors, ou non mentionnées par nos botanistes, et, comme on pourra s'en convaincre par les indications que je fournis dans ce travail, mes recherches n'ont pas été vaines.

Dans mes excursions, j'ai voulu prendre pour guide les ouvrages de MM. Kickx, Dekin et Passy; mais je dois avouer que les indications de ces savants ne m'ont pas toujours fait retrouver plusieurs des espèces rares qu'ils signalent. — Il est vrai que, depuis cette époque, les en-

virons de Bruxelles ont bien changé; les bois, les marais, les terrains incultes ont été transformés par la culture ou livrés à l'industrie. Ce fait nous explique pourquoi plusieurs de nos botanistes ont vainement cherché à découvrir différentes espèces qu'on rencontrait auparavant dans la partie du bois de Forest, où s'élève aujourd'hui la campagne de M. Mosselman, espèces qui ont cessé de se multiplier, quand les bouleversements opérés dans cette partie des environs de Bruxelles sont venus modifier les conditions de la végétation. Citons, parmi les plantes qui ont disparu depuis quelque temps, le *Teucrium scordium*, le *Talictrum aquilegifolium*, le *Trifolium alpestre*, l'*Orchis Simia*, etc., etc.

Je crois devoir faire remarquer que la partie du bois de Forest, qui offrait ces richesses végétales, présente un tout autre aspect depuis environ trente ans. Ces belles collines ombragées par des arbres séculaires, dont le pied était arrosé par le ruisseau le *Kesbeek*, près duquel se trouvait le château, dont, il y a dix ans, on apercevait encore les ruines, ces prairies tourbeuses, couvertes de *Sphagnum palustre*, devaient nécessairement favoriser une végétation perdue aujourd'hui pour la flore bruxelloise. Quelques faibles restes de cette végétation si riche, subsistent dans ces environs; le *Sphagnum palustre* abonde encore dans certains fonds tourbeux, et, il y a peu de mois, un jardinier a trouvé près du *Vossengat* (Trou du Renard), un beau pied d'*Osmonda regalis*.

D'autres stations sont perdues pour les botanistes, depuis peu d'années ; ainsi, le rare *Bunias Erucago*, trouvé par notre savant confrère, M. L. Piré, n'existe plus. Il est regrettable que ce botaniste n'ait pas resemé cette plante à quelques pas plus loin.

En publiant mon premier fascicule, j'ai parlé de la petite ville de Mantes, située à 4 lieues environ de Paris. Un de mes confrères a semblé douter de l'existence de cette localité ; en consultant la carte de France, il pourra se convaincre que c'est avec raison que je maintiens mes indications à ce sujet.

Il me reste à remercier les botanistes qui ont bien voulu me fournir des indications utiles à mon travail. Je me fais un devoir de citer en première ligne mon honorable ami et confrère M. Dandois, de Loupoigne, dont le zèle infatigable a fourni à la Flore belge plusieurs espèces nouvelles.

Je dois bon nombre d'espèces rares à l'obligeance de M. Baguet, qui m'a souvent accompagné dans mes herborisations. MM. Dumortier, Bommer, le Dr Vanhaesendonck, l'abbé Strail et le Rév. Bellynck ont également droit à toute ma reconnaissance.

PREMIÈRE PARTIE.

ESPÈCES CRITIQUES.

Fam. 61. — UTRICULARIACÉES.

Utricularia neglecta. Lehm.

Je crois devoir donner les caractères de l'*Utricularia neglecta*, afin d'engager les botanistes belges à examiner avec attention cette espèce qui peut très-facilement être confondue, au premier aspect, avec les *U. vulgaris* et *intermedia.*

Fleurs cinq à dix, en grappes terminales; lèvre supérieure de la corolle, une à deux fois plus longue que le palais, entière au sommet; éperon conique, ascendant. — Anthères libres. Feuilles étalées en tous sens, ovales dans leur pourtour, deux à trois fois pennatiséquées-multipartites, à segments capillaires, très-finement denticulés-épineux, munis de vésicules. — Les autres caractères, comme dans l'*U. vulgaris.*

Fam. 67. — RHINANTIDÉES. Prodr.

Trib. 5. Veronicées.

Veronica anagalloïdes. Juss.

Cette espèce, confondue souvent avec le *V. anagallis* L. diffère par ses pédoncules et par ses pédicelles poilus-glanduleux. Les divisions du calice sont étroitement lancéolées-aiguës, de même longueur que la corolle blanchâtre et striée. — Capsule elliptique, obtuse, obscurément émarginée. Feuilles étroitement lancéolées ou sublinéaires, aiguës, embrassantes à la base, entières ou à peine dentées.

Fam. 77. — CUSCUTACÉES.

Cuscuta trifolii Babington.

Var. Strailii.

Je donne ce nom à une cuscute trouvée, il y a trois ans, sur la luzerne, à Saint-Gilles; voici ce qui résulte de l'analyse faite par mon honorable ami, M. l'abbé Strail : La plupart des caractères de cette plante sont les mêmes que dans la *C. Trifolii Babing.*, mais elle en diffère néanmoins par ses styles qui sont toujours recourbés en crosse, l'un vers l'autre, tandis que dans la cuscute du trèfle ils sont rejetés sur les côtés, et, par conséquent, toujours divariqués.

M. Strail considère cette plante comme une variété très-

remarquable de la *Cuscuta trifolii Babing.*; j'espère qu'il voudra bien me permettre de la lui dédier.

Corolle à cinq et quelquefois à six divisions, étalées après l'anthèse. — Calice à divisions non charnues, appliquées sur le tube de la corolle et plus courte que lui. — Étamines un peu plus longues que le tube de la corolle. — Styles à stigmates non capités, divergents dès la base, plus longs que le tube de la corolle, ainsi que des étamines. — Écailles frangées, larges, — bifides étalées. — Glomérules des fleurs, munis d'une bractée assez large.

Cuscuta mulleri. Strail. Cette espèce, que j'avais indiquée dans le premier fascicule de mon spicilége, a été décrite, par notre savant confrère, M. Ch. Strail, dans une notice sur *une nouvelle espèce de Cuscute*; je me permets d'extraire le passage suivant, en parlant des deux espèces, qui ont été observées par lui, dans un champ de trèfle. « Outre que ces deux plantes ont chacune un aspect particulier qui, au premier abord, empêche de les confondre, dans l'une, le calice est beaucoup plus court que la corolle, dont le limbe, étalé après l'anthèse, est ensuite réfracté sur le calice; dans l'autre, au contraire, le calice est plus long que la corolle et les divisions du limbe de ces enveloppes florales étant très-épaisses, il n'y a jamais d'épanouissement; la fécondation s'y opère à corolle fermée.

Les glomérules des fleurs sont beaucoup moins volumineux que dans l'autre espèce, et ses ramifications sont très-nombreuses.

C. Mulleri Strail. Styles plus courts que le tube de la corolle; corolle plus courte que le calice, restant toujours fermé. Écailles à bords laciniés, dressées.

Fam. 113. — COMPOSÉES.

Cirsium anglicum Lob.

Je m'abstiendrai de donner l'analyse de cette remarquable espèce, que nous avons découverte, l'année dernière, à Beggynendyck, dans une de nos herborisations, avec MM. le docteur Vanhaesendonck, E. Chevalier et A. Thielens, ce dernier en ayant déjà donné, dans les Bulletins de la Société royale de botanique de Belgique, tous les caractères.

Je crois cependant devoir faire observer que cette composée est vivace et non bisannuelle.

DEUXIÈME PARTIE.

ÉNUMÉRATION SYSTÉMATIQUE

Classe Ire. — JULOSÉPALES.

CONIFÈRES.

Juniperus Lin.

Juniperus communis L. — ♄ Avril-mai. Bruyère à Sart-Dames Avelinnes (Dandois).

SALICINÉES.

Salix Lin.

Salix cinerea L. — ♄ Avril. Bord d'un ruisseau, prairie à Forest.
— *Smithiana* Wild. — ♄ Avril-mai. Bord d'un ruisseau à Saint-Gilles.
— *viminalis* L. — ♄ Mars-avril. Bois marécageux à Soetwater (Bag.).
— *Helix* L. — ♄ Mars-avril. Environs d'Aerschot.
— *Seringaeana*. Gand.— ♄ Bords des eaux. Soetwaeter, Gelrode. (Thiel.)
— *bicolor* Ehrh. — ♄ Avril. Prairies à Forest, un seul pied.
— *Helix* L. — ♄ Mars-avril. Environs d'Aerschot.

QUERCINÉES.

Quercus Lin.

Quercus sessiliflora Sm. — ♄ Avril-mai. Bois et bords des chemins.
— *pedunculata* Ehrh. — ♄ Avril-mai. Bois et chemins.

Classe III. — TOROSÉPALE.

CALLITRICHINÉES Link.

Callitriche Lin.

Callitriche verna L. — ① Avril-septembre. Étangs.
— *stagnalis* Scop. — ① Avril-septembre, étangs et mares.

URTICINÉES.

Parietaria Lin.

Parietaria officinalis L. — ♃ Juin-septembre. Au pied d'un vieux mur, à Houtain (Dandois).

CHENOPODIACÉES.

Chenopodium Lin.

Chenopodium foetidum Lamk. — ① Juillet-août. Talus à Saint-Gilles et Etterbeek.
Anserina Bonus Henricus Dmt. Chenopod. L. — ♃ Mai-août. Près des habitations.
— *murale* L. — ① Juillet-septembre. Champs à Saint-Gilles.
— *opulifolium* Schrad. — Champs à Kessel-Loo (Bag.).

POLYGONÉES.

Polygonum.

Polygonum lapathifolium Lin. — ① Juillet-septembre. Bords de la Senne à Forest (H. Louis).

RUMICINÉES.

Rumex Hook.

Rumex maritimus L. — ① Août-septembre. Ancien étang à Sart-Dames-Avelinnes (Dandois).

Classe IV. — TOROCORONÉES. Lamk.

LABIÉES.

Salvia Tourn.

Salvia verbenacea L. — ♃ Juin-septembre. Remparts de Louvain (Bag.).

Scutellaria Lin.

Scutellaria minor L. — ♃ Juillet-septembre. Environs d'Aerschot.

Brunella Lin.

Brunella surrecta Dmt. — ♃ Juin-août. Bords des chemins.
— *reptans* Dmt. — ♃ Juin-septembre. Bords des chemins.

Galeopsis Scop.

Galeopsis angustifolia Hoff. — ① Juillet-août. Lieux pierreux, talus du chemin de fer à Bousval (Dandois).

Lamium Lin.

Lamium hybridum Wild. — ① Champs à Loupoigne (Dandois)

Leonurus Lin.

Leonurus Cardiaca L. — ♃ Juillet-août. Talus à Uccle (Louis).

Marrubium.

Marrubium vulgare L. — ♃ Juin-juillet. Environs de La Hulpe.

Thymus Scop.

Thymus serpyllum var. *Chamaedrys* Koch. —. ♃ Juin-octobre. Vieux murs à Nivelles. (Dandois).
— *Chamaedrys* Fries.

Calamintha.

Calamintha Acinos Gand. — ♃ Mai-septembre. Talus à Uccle.

Mentha Lin.

Mentha rotundifolia L. Sm. — ♃ Juillet-août. Bords des chemins humides. Machelen, Ternath.

Mentha dulcissima Dmt. *velutina* Lej. nec Ehrh. — ♃ Juillet-septembre. Endroits sécs. Lembeeq. Environs d'Aerschot.

UTRICULARIACÉES.

Utricularia.

Utricularia intermedia Hayn. — ♃ Juin-août. Marais à Denderleeuw.

— *neglecta* Lehm. — ♃ Juin-août. Fossés des anciens étangs d'Etterbeek. Cette plante, que M. Piré a remarquée le premier, a pu être confondue ailleurs avec le *V. vulgaris*.

MONTIACÉES Comm. Botan.

Montia Mich.

Montia fontana L. — ① Mai-juillet. Champs à Grand-Bigard (Bommer.) Waelhem.

OROBANCHIDÉES Vent.

Orobanche.

Orobanche rapum Thuil. — ① Juin-juillet. Sur le genêt à Saint-Job.

— *minor flavescens* Gr. et God. *O. carotæ* Desm. — ① Juillet. Sur les racines du trèfle. Saint-Gilles.

— *hederae* Duby. — ♃ Juin-août. Sur le lierre. Bois de Forest (Saint-Gilles).

Cette belle espèce a été trouvée par M. Gille, professeur à l'école vétérinaire de l'État, au mois de juillet dernier; elle est très-rare dans nos environs. Je l'ai trouvée dans d'autres localités au pied des lierres de fortes dimensions.

Lathraea Lin.

Lathraea squamaria L. — ♃ Avril-mai. Voisinage des bois à Baisy-Thy (Dandois).

RHINANTHIDÉES Prodr.

Odontites Dmt.

Odontites serotina Dmt. *Euphr. odont.* L. — ① Juin-août. Nethen, Soetwaeter (Bag.).

Euphrasia.

Euphrasia rigidula Jord. — ① Juin-août. Fossés secs à Bousval (Dandois).

Limosella Lin.

Limosella aquatica L. — ① Juin-août. Winghe-Saint-Georges (Thielens).

Veronica Tourn.

Veronica anagalloides Guss. — ♃ Juin-septembre. Eaux peu profondes, fossés à Waelhem.

— *praecox* All. — ① Avril-juin. Champs entre Ever et Haeren (Mrt).

— *longifolia* L. — ♃ Juin-juillet. Bords de la grande Nèthe, à Lierre.

Antirrhinum Tourn. Desf.

Antirrhinum majus L. — ♃ Juin-septembre. Çà et là sur les vieux murs.

Kickxia Dmt.

Kickxia hexandra Dmt. D.-C. — ① Juillet-septembre. Marécages à Schoenhoven (Thielens).

Digitalis Lin.

Digitalis purpurea L. — ② Juin-août. Bois de la Cambre.

Scrophularia Tourn.

Scrophularia vernalis L. — ② Avril-mai. Saint-Géry (Brab.), Enghien (Rév. P. Bellynk).

SOLANÉES Juss.

Hyoscyamus Tourn.

Hyoscyamus niger L. — ② Mai-août. Décombres; Louvain, Wilsele (Bag.).

Boraginées Vent.

Myosotis strigulosa Dmt. — ② Mai-juin, Boisfort (Piré).

Pulmonaria Lehm.

Pulmonaria angustifolia L — ♃ Avril-mai. Lubeck et Binkom (Thielens).

Lycopsis Lin.

Lycopsis arvensis L. — ① Mai-août. Champs sablonneux à Saint-Gilles.

CUSCUTACÉES Prodr.

Cuscuta Prodr.

Cuscuta Mullerii Strail. — ♃ Août-octobre. Champs de trèfles.
— *epilinum* Weihe. — ① Juillet. Champs de lin.
— *major* L. — ① Juin-septembre. Jodoigne-Souveraine (Bag). Baulers (Cogn.).
— *epithymum* Murr. — ① Juillet-août. La Hulpe.
— *Strailii.* — ♃ Juin-août. Champs de luzerne à Saint-Gilles.

APOCYNÉES R. Br.

Vinca Lin.

Vinca minor L. — ♃ Mai-août. Talus, lisière des bois. Uccle, Linkebeek, Limal, Molenbeek-Saint-Jean (Bommer).

ILLICÉES Comm. Bot.

Ilex Lin.

Ilex aquifolium L. — ♃ Mai-juin. Forêt de Soigne, Boitsfort.

PRIMULACÉES Vent.

Lysimachia Tourn.

Lysimachia nemorum L. *Lerouxia* Mérat. — ♃ Juin-août. Bois.

Hottonia Boerh.

Hottonia palustris L. — ♃ Mai-juillet. Fossés aquatiques à Saint-Gilles, Molenbeek-Saint-Jean et Laeken (Bommer).

Classe V. — GYNOCOROLLÉES.

CAMPANULACÉES Juss.

Campanula.

Campanula persicifolia L. — ♃ Juin-juillet. Bois à Glabbeck, Binckom, (Thielens).
— *rapunculoides* L. — ♃ Juin-août. Uccle.

Prismatocarpus L'Her.

Prismatocarpus hybridus L'Her. — ① Juin-juillet. Moissons à Saint-Gilles et Uccle.

SYNANTHÉRÉES.

Scorzonera De C.

Scorzonera humilis L. — ♃ Mai-juillet. Pré frais à Bousval (Dandois).

Hieracium Lin. Cass.

Hieracium tridentatum Fries. — ② Juin-août. Bois de la Cambre.
— *maculatum* Sm. — Juin-août. Terres sablonneuses, lisières des bois. Uccle, Saint-Job.

Taraxacum Juss. De C. Cass.

Taraxacum laevigatum D. C. — ♃ Mai-août. Environs de Waelhem.
— *palustre* D. C. — ♃ Mai-juillet. Prairies humides. Elewyt (Thielens).

Barkhausia De C.

Barkhausia foetida D. C. — ① Juillet-août. Champs à Baisy-Thy (Dand.).

Lactuca Lin.

Lactuca Scariola L. — ① Juillet-août. Lieux pierreux à Louvain (Bag.).
— *muralis* Fries *Prenanthes* L. — ① Juillet-septembre. Abbaye de Villers.

Petasites Cass.

Petasites vulgaris Desf. — ♃ Mars-mai. Bords des rivières, Wilsele, Aerschot (Bag.).

Artemisia Moench. Cass.

Artemisia absinthium L. — ♃ Août-septembre. Abbaye de Villers.

Anthemis Moench. Cass.

Anthemis tinctoria L. — Juillet-septembre. Remparts de Louvain (Bag.).
— *arvensis* L. — Coteaux secs à Wavre (Bommer).

Phalacroloma Cass.

Phalacroloma annuum Dmt. *Aster* L. — ① Juillet-septembre. Boitsfort, Groenendael.
Aster multiflorus L. — ♃ Août-septembre. Pré humide à Feluy (Dand.). Échappée des jardins.

Senecio Lin.

Senecio sarracenicus L. — ♃ Juillet-août. Boitsfort, Groenendael.
— *sylvaticus* L. — ① Juin-août. Uccle, bois de la Cambre.

Doronicum Lin.

Doronicum procurrens Dmt. — ♃ Mai-juillet. Bois de Grimberghen (Wism.).

Cineraria Cass.

Cineraria palustris L. — ② Juin-juillet. Étang de Groenendael.
— *spatulæfolia* Gmel. — ② Mai-juillet. Winsele, Berthem (Bag.).

Rudbekia De C.

Rudbekia digitata D. C. — Juin-août. Bords de la Nèthe. Lierre. Cette espèce, que j'ai observée pour la première fois, il y a quinze ans, se propage d'année en année ; elle est sans aucun doute échappée d'un des nombreux jardins qui se trouvent aux bords de cette rivière.

Centaurea.

Centaurea solstitialis D. C. *Calcitrapa* Lamk. — ② Juillet-septembre. Saint-Gilles (Piré), Louvain (Bag.), Bousval (Dandois).

— *decipiens* Thuil. — ♃ Août. Collines schisteuses, Ways. (Dandois).

— *Calcitrapa* L. — ② Juillet-août. Près de la station du chemin de fer à Vilvorde (Wesmael).

Serratula.

Serratula tinctoria L. — ♃ Juin-septembre. Environs d'Aerschot.

Cirsium Tourn.

Cirsium anglicum Lob. — ♃ Juin-juillet. Sapinière à Beggynendyck.

— *acaule* All. — ♃ Juin-août. Coteaux secs à Forest (Bommer).

DIPSACÉES Juss.

Dipsacus Lin.

Dipsacus pilosus L. — ① Juin-août. Bords d'une mare à Feluy (Dandois).

— *sylvestris* L. — ② Juillet-août. Bords des chemins.

VALERIANACÉES Batsch.

Valerianella Tourn.

Valerianella carinata Lois. — ① Avril-mai. Environs de Louvain.

— *dentata* D. C. — ① Mai-juillet. Champs à Aerschot, Wilsele (Thielens).

— *auricula* D. C. — ① Mai-juillet. Louvain, Héverlé (Bag.). Manage (Cogniaux).

— *Morisonii* D. C. — ① Mai-juillet. Haeren, Héverlé (Bag.).

RUBIACÉES Juss.

Asperula Lin.

Asperula taurina L. — ♃ Mai-juin. Bois de Grimberghen (Wesmael). Cette espèce, originaire de l'Europe australe, ne peut être considérée comme indigène ni même subspontanée.

Asperula odorata L. — ♃ Mai-juillet. Haie à Anderlecht, bois de Meerdael (Bag.), Nivelles (Dandois).

Galium commutatum Jord. — ♃ Juin. Bois d'Hez à Baisy-Thy (Dandois).

SAMOLINÉES Comm. Botan.

Samolus Lin.

Samolus Valerandi L. — ② Juin-août. Bords d'un étang à Hingene.

Classe VI. — GYNOPÉTALES.

OMBELLIFÈRES.

Sanicula Lin.

Sanicula Europaea L. — ♃ Mai-juin. Bois montueux à Ucele et Ganshoren (Bommer).

Hydrocotyle Lin.

Hydrocotyle vulgaris L. — ♃ Mai-juillet. Waelhem, Duffel.

Sium L.

Sium latifolium L. — ♃ Juillet-août. Fossés à Denderleeuw. Uccle (Bommer).

Oenanthe fluviatilis Col. — ① Juillet. Rivière profonde, à la Roche, Court-Saint-Étienne (Dandois).

Cicuta Lin.

Cicuta virosa L. — ♃ Juillet. Bords des étangs à Rouge-Cloître.

Selinum Gœrtn.

Selinum carvifolia L. — ♃ Juillet-septembre. Sapinière à Beggynendyck.

Peucedanum Koch.

Peucedanum palustre Moench. — ♃ Juin-août. Betecom, Rotselaer (Bag.).

Classe VII. — CALYPÉTALES.

CRASSULACÉES Juss.

Sedum De C.

Sedum Bolonieuse Lois. — ♃ Juin-juillet. Talus sec à Uccle.
— *reflexum* L. — ♃ Juin-juillet. Vieux murs, talus du chemin de fer de Louvain, Wilsele, Kessel-Loo (Bag.).
— *elegans* Lej. — ♃ Juin-juillet. Vieux murs à Saint-Gilles (Piré).

SAXIFRAGÉES Juss.

Saxifraga Lin.

Saxifraga hypnoides L. — ♃ Mai-juin. Vieux murs à Nivelles, Baisy-Thy (Dand.). Subspontané.

ONAGRÉES Juss.

Epilobium Lin.

Epilobium roseum Schreb. — ♃ Juillet-août. Environs d'Aerschot.
— *obscurum* Schreb. — ♃ Juillet-août. Ruisseau à Bousval, Loupoigne (Dandois).
— *palustre* L. — ♃ Juillet-août. Ever (Wesmael).
— *tetragonum* L. — ♃ Juillet-août. Lieux frais à Braine-le-Comte, Sart-Dame-Avelinnes, abbaye de Villers (Dandois).

Isnardia Lin.

Isnardia palustris L. — ♃ Endroits marécageux à Aerschot.

HALORAGIDÉES Dmt.

Myriophyllum Lin.

Myriophyllum alternifolium D. C. — Marais à West-Meerbeek, Gelrode (Bag.).
— *spicatum* L. — ♃ Fossés à Aerschot.

ROSACÉES Juss.

Rosa Lin.

Rosa rubiginosa L. — ♃ Juillet-août. Coteaux à Nethen (Thielens), Vieux-Héverlé (Bag.).

Rosa tomentella Leman. — ♃ Buissons à Vilvorde (Thielens).
— *arvensis* L. — ♃ Juin-juillet. Bois et buissons à Rebecq-Rognon, Loupoigne, Feluy (Dandois).

AGRIMONIA Tourn.

Agrimonia odorata Mill. — ♃ Lisière du bois entre Groenendael et La Hulpe.

RUBUS Lin.

Rubus idœus L. — ♃ Mai-juin. Bois de la Cambre.
— *suberectus* Anders. — ♃ Mai-juin. Saint-Job (Bommer).

SPIRAEA Gaertn.

Spiraea salicifolia L. — ♃ Juin-août. Haies, buissons.
— *Ulmaria* L. *B. denudata* J. Gand. — ♃ Mai-juin. Anderghem.

AMYGDALINÉES.

CERASUS Dec.

Cerasus Padus D. C. *Prunus* L. — ♃ Mai-juin. Forest, près du bois; Loupoigne, Baisy-Thy, Seneffe (Dandois).

LÉGUMINEUSES.

LATHYRUS Lin.

Lathyrus hirsutus L. — ① Juin-août. Moissons. Haeren (Wesmael).
— *tuberosus* L. — ♃ Mai-juillet. Moissons à Ever, Dieghem (Wesmael).
— *villosa* Roth. — ① Juin-juillet. Terrain vague près l'abbaye de Villers (Dandois).

ORNITHOPUS Desv.

Ornithopus perpusillus L. — ① Mai-août. Sables à Stalle (Uccle).

CORONILLA Lam.

Coronilla varia L. — ♃ Juin-août. Environs d'Aerschot, Louvain.

TRIFOLIUM Tourn.

Trifolium striatum L. — ① Juin-août. Anderlecht (Martinis).
— *agrestinum* Jord. — ① Juillet. Bruyères à Basse-Wavre (Dand.).

GENISTA Lam.

Genista tinctoria L. — ♃ Juin-août. Environs d'Aerschot.
— *pilosa* L. — ♃ Mai-septembre. Terres sablonneuses à Bonheyden.

RHAMNIDÉES R. Br.

RHAMNUS Gaertn.

Rhamnus catharticus L. — ♀ Mai-juin. Bois de Forest (Gille).

CELASTRINÉES Dec.

EVONYMUS Tourn.

Evonymus Europaeus L. — ♄ Mai-juin. Bois La Hulpe, Groenendael.

GROSSULARIACÉES De C.

RIBES Lin.

Ribes rubrum L. — ♄ Avril-mai. Bois de la Cambre.

CLASSE VIII. — TOROPÉTALES.

EUPHORBIACÉES Juss.

EUPHORBIA Lin.

Euphorbia Gerardiana Jacq. — ♃ Mai-juin. Bois humides à Peuthy (Wesmael).
— *Esula* L. — ♃ Mai-août. Champs à Perck.
— *lathyris* L. — ① Juillet-août. Bords des chemins. Louvain (Bag.).

Je ne pense pas qu'on puisse le considérer comme indigène. Cette espèce est propre à l'Europe moyenne et australe.

MERCURIALIS Tourn.

Mercurialis perennis. L. — ♃ Avril-mai. Bois à Limal (Bommer) Perck.

GÉRANIACÉES Juss.

GERANIUM L'Her.

Geranium Phaeum L. — ♃ Mai-juillet. Grand-Bigard (Bommer, Fire).

ERODIUM L'Her.

Erodium moschatum L'Her. — ① Mai-septembre. Plancenoit (Bag.).

MALVACÉES Juss.

ALTHAEA Cav.

Althaea officinalis L. — ♃ Juillet-août. Bords de la Dyle, Wilsele (Bag.).

HYPERICINÉES Juss.

HYPERICUM.

Hypericum dubium L. — ♃ Juillet-août. Groenendael, La Hulpe.
— *elodes* Lin. *Elodes palustris* Spach. — ♃ Juillet-septembre. Aerschot, Bonheyden.

PYROLACÉES Prodr.

PYROLA Tourn.

Pyrola rotundifolia L. — ♃ Mai-juillet. Bois de Lovenjoul (Piré).

STELLARIACÉES Prodr. *Cariophyllées* Juss.

SILENE Lin.

Silene gallica L. — ① Juin-août. Près du château de M. P. Claes, à Lembecq.

GYPSOPHILA Lin.

Gypsophila muralis L. — ① Juillet-septembre. Environs de Louvain, champs humides à Tremeloo (Bag.).

SAPONARIA Smith.

Saponaria Vaccaria L. — ① Juin-juillet. Moissons à Lembecq.

SAGINA Lin.

Sagina nodosa Fenzl. — ② Juillet-août. Marécages à Beggynendyck.
— *procumbens* L. — ♃ Mai-septembre. Gelrode (Thielens).

CORRIGIOLACÉES-*Corrigiolées* Prodr.

CORRIGIOLA Lin.

Corrigiola littoralis L. — ① Juillet-août. Terres sablonneuses à Aerschot.

PARNASSIA Tourn.

Parnassia palustris L. — ♃ Juillet-septembre. Prairies marécageuses à Rosières (Bommer).

VIOLACEES Dmt. VIOLARIÉES De C.

VIOLA Tourn.

Viola palustris L. — ♃ Avril-juin. Bergh, Tremeloo (Thielens), Waelhem.
— *Riviniana* Rchb. — ♃ Mai-juin. Chemins ombragés à Waelhem.

RANUNCULACÉES De C

ANEMONE Hall.

Anemone sylvestris L. — ♃ Avril-mai. Bois à Groenendael (S. Saunier).

MYOSURUS Lin.

Myosurus minimus L. — ① Avril-mai. Champs humides à Uccle, Waelhem.

BATRACHIUM Dmt. RANUNCULACÉES Juss.

Batrachium hederaceum Dmt. — ♃ Avril-août. Mares à Aerschot.
— *circinatum* Fr. — ♃ Juin-août. Etang à Basse-Wavre (Dandois).
— *peucedanifolium* Dmt. — ♃ Mai-juillet. Rivières à Louvain, canal de Charleroi à Anderlecht.

AQUILEGIA Lin.

Aquilegia vulgaris L. — ♃ Mai-juin. Genappe, Feluy, vieux murs (Dand.). Bois à Penthy (Thielens).

BERBERIDÉES Juss.

BERBERIS Lin.

Berberis vulgaris L. — ♄ Mai-juin. Uccle (Bommer).

CRUCIFERÉES Juss.

CARDAMINE De C.

Cardamine hirsuta L. — ① Avril-mai. Bords des ruisseaux, Forest, Linkebeek.
— *impatiens* L. — ① Mai-juin. Bords de la Dyle, Malines, Lubecke Binckom (Thielens).

ARABIS Lin.

Arabis sagittata D. C. — ♃ Mai-juillet. Murs à Louvain (Bag).

ERYSIMUM Lin.

Erysimum orientale R Br. — ① Juin-août. Molenbeek-Saint-Jean, Vlierbeek (Gaut.).

CHEIRANTHUS R Br.

Cheiranthus Cheiri L. — ♃ Mai. Vieux murs, abbaye de Villers, Sainte-Gudule à Bruxelles.

CAMELINA Crantz.

Camelina dentata Pers. — ① Mai-juillet. Champs de lin à Aerschot.

THLASPI Dill.

Thlaspi montanum L. — ♃ Avril-mai. Colline sèche, au hameau de Rixensart, à Baisy-Thy (Dandois).

— *perfoliatum* L. — ① Avril-mai. Champs schisteux au bois d'Hez, à Baisy-Thy (Dandois).

SENEBIERA Poir.

Senebiera Coronopus Poir. — ① Juin-août. Chemin du canal, à Laeken.

FUMARIACÉES Juss.

FUMARIA Tourn.

Fumaria pallidiflora Jord. — ① Juin-septembre. Haies et champs à Tervueren.

— *media* Lois. — ① Mai-août. Champs sablonneux.

— *officinalis* L. — ① Champs à Schaerbeek.

Cette espèce, confondue souvent avec la précédente, se distingue au premier coup d'œil, par ses graines profondément échancrées. Elle est assez rare partout.

NYMPHEACÉES. *Nympheacearum*. Pars. De C.

NYMPHAEA. Sm.

Nymphaea alba. Lin. — ♃ Juin-août. Étangs à Bergh var : β. minor.

Classe. X. — CALYTÉPALES.

Hydrocharis. Lin.

Hydrocharis Morsus ranæ. L. — ♃ Juin-août. Fossés à Saint-Gilles.

ALISMACÉES. Prodr.

Butomus. Tourn.

Butomus umbellatus. L. — ♃ Juin-août. Fossés et étangs entre Bruxelles et Vilvorde.

Classe XI. — GYNOTÉPALÉES.

ORCHIDÉES. Juss.

Orchis. Rich.

Orchis militaris. L. — ♃ Mai-juin. Rouge-cloître. (Piré).
— *coriophora.* L. — ♃ Mai-juin. Prairies à Heverlé Corbeek-Dyle (Bag.).
— *mascula.* L. — ♃ Avril-juin. Pelouse à Linkebeek.

Classe XII. — GYNOCHLAMYDÉES.

NARCISSINÉES. Fam. des plantes.

Narcissus. Lin.

Narcissus Pseudonarcissus. L. — ♃ Avril-mai. Bois. Berchem, Vlesembeek.

Classe XIII. — TOROCHLAMYDÉES.

ASPARAGINÉES. Juss.

Ruscus. Tourn.

Ruscus aculeatus. L. — ♃ Mars-avril. Bois du duc d'Arenberg, à Enghien (Louis).

LILIACÉES. Vent.

Endymion. Dmt.

Endymion nutans. Dmt. Scilla Sm. — ♃ Mai. Bois de la Cambre, Laerbeek.

Allium. Lin.

Allium carinatum. L. — ♃ Juillet-août. Molenbeek-Saint-Jean (Piré).

POTAMOGETONÉES.

Potamogeton. Tourn.

Potamogeton rufescens, Schrad. — ♃ Juin-août. Vieux-Heverlé, Keśsel-Loo (Thiel).

— *helodes*. Dmt. — ♃ Juillet-août. Environs d'Aerschot.

— *perfoliatus*. L. — ♃ Juin-août. Canal de Louvain. (Bag.).

— *pusillus*. L. — ♃ Juin-août. La Hulpe, (Piré), Héverlé (Bag.).

Zannichelliacées.

Zannichellia palustris. L. — ① Juillet. Canal de Charleroi à Anderlecht, Aerschot.

NAIADÉES. Prodr.

Caulinia. Wild.

Caulinia fragilis. Wild. — ① Laeken, Bergh.

LEMNACÉES. Comm. Bot.

Lemna. Lin.

Lemna trisulca. L. — ① Juin-juillet. Fossés et étangs à Lembecq et Waelhem, Molenbeek-Saint-Jean.

JUNCINÉES.

Juncus. Mich.

Juncus obtusiflorus. Ehrh. — ♃ Juin-juillet. Aerschot, Bergh (Bommer).

Juncus lamprocarpus. Ehrh. — ♃ Juin-août. Parc, Kessel-Loo (Bag.).
— *Tenageia* Ehrh. — ① Juin-août. Lieux humides, Peuthy. (Wesm.).
— *tenuis*. Wild. — ♃ Mai-juin. Env. : d'Aerschot, Bonheyden.
— *bulbosus*. L. — ♃ Juin-juillet. Lieux humides à Bornhem.
— *Gerardi*. Lois. — ♃ Juin-juillet. Bords du canal à Bornhem.

Classe XIV. — ACHNOSPATHÉES.

GRAMINÉES.

Brachypodium. Beauv.

Brachypodium sylvaticum. Beauv. — ♃ Juill.-août. Court-St-Étienne (Thiel).

Festuca. Agrost. Belg.

Festuca gigantea. Vill. ♃ Juillet-août. Bois de la Cambre, Tervueren.
— *ovina*. L. — ♃ Mai-juin. Pelouses, bois, Uccle et La Hulpe (Bommer).
— *rubra*. L. — ♃ Juin-août. Mêmes localités (Bommer).

Vulpia. Agrost. Belg.

Vulpia Pseudomyuros S. W. — ① Mai-juin. Coteaux secs à Limelette (Bommer).
— *sciuroides*. Gmel. — ① Mai-juin. Même localité (Bommer).

Bromus. Hall.

Bromus racemosus. L. — ① Mai-juin. Prairies à Hoeylaert (Bommer).
— *secalinus*. L. — ① Var : *divaricatus*. Juin-juillet. Moissons à Rosières (Bommer).
— *tectorum*. L. — ① Mai-juin. Endroits secs à Uccle, Saint-Gilles (Bommer).

Glyceria. R. Br.

Glyceria plicata. Fries. — Juin-juillet. Endroits humides à Laeken (Bommer).

Enodium. Pers.

Enodium coeruleum. Gand. — ♃ Août. Bois de Soignes (Bommer).

MELICA. Agrost. Belg.

Melica uniflora. Retz. — ♃ Mai-juin. Bois de la Cambre.

BRIZA. Gært.

Briza media. L. — ♃ Mai-Juin. Coteaux secs à Forest.

POA. Agrost. Belg.

Poa compressa. L. — ♃ Juin-juillet. Champs sablonneux vieux murs, à Forest (Bommer).

— *nemoralis*. L. — ♃ Juillet-août. — *var : tenella*. — Bois de Soignes (Bommer). — *var : coarctata*. — Saint-Gilles.

DESCHAMPSIA. Beauv.

Deschampsia coespitosa. Beauv. — ♃ Juin-juillet. Bois de la Cambre.

AIRA. Beauv.

Aira caryophyllea. L. — ① Mai-juil. Endroits secs, Boisfort.

CORYNEPHORUS. Beauv.

Corynephorus canescens. Beauv. — ♃ Juin-août. Endroits secs, Uccle (Bommer).

TRISETUM. Agrost. Belg.

Trisetum praecox. Dmt. — ① Avril-juin. Coteaux secs à La Hulpe.

DANTHONIA. D. C.

Danthonia decumbens. L. — ♃ Juin-juillet. Environs d'Aerschot.

CALAMAGROSTIS. Agrost. Belg.

Calamagrostis lanceolata, Roth. — ♃ Juin-juillet. Bois spongieux à Loupoigne (Dandois).

— *epigeios*. Roth. — ♃ Juillet-août. Coteaux secs à Forest.

AGROSTIS.

Agrostis stolonifera. L. — ♃ Juillet-août. Champs. Waterloo, Jette-Saint-Pierre, Berchem, Sainte-Agathe (Bommer).

Agrostis stolonifera. L. Var : *coarctata*. — Endroits secs et sablonneux à La Hulpe (Bommer).

ALOPECURUS. L.

Alopecurus fulvus. Sm. — Juin-août. Endroits humides, Groenendael (Bommer).

LEERSIA. Soland.

Leersia oryzoides. Sol. — ♃ Août-septembre. Bords du Canal de Louvain, Corbeek-Loo (Baguet).

MILIUM. Beauv.

Milium effusum. L. ♃ Mai-juin. Bois à Ganshoren et Groenendael (Bommer).

DIGITARIA. Koel.

Digitaria sanguinalis. Scop. — ① Juin-août. Champs sablonneux à Bornhem.

— *filiformis*. Hal. — ① Juin-août. Champs sablonneux à La Hulpe.

SETARIA. Beauv.

Setaria glauca. Beauv. — ① Juillet-août. Dilbeek (Bommer).

NARDUS. Beauv.

Nardus stricta. L. — ♃ Juin-juillet. Champs sablonneux à Uccle et Waelhem.

CYPERIDÉES. Cyperoidées. Juss.

CAREX.

Carex dioica. L. — ♃ Avril-juin. Marais à Bergh (Bommer).
— *pulicaris*. L. — ♃ Mai-juin. Pellenberg (Baguet).
— *arenaria*. L. — ♃ Avril-Mai. Terrains sablonneux à Bonheyden.
— *intermedia*. Good — ♃ Avril-Mai. Prairie à Laeken (Bommer).
— *ovalis*. Good. — ♃ Avril-Mai. La Hulpe et Saint-Job (Bommer).
— *vulpina*. L. — ♃ Avril-Mai. Prés humides à Laeken.
— *divulsa*. Good. — ♃ Avril-Mai. Lieux herbeux à Lubbeek (Bag)
— *remota*. L. — ♃ Mai-juin. Marais à Beggynendyck.

Carex elongata. L. — ♃ Mai-juin. Bois marécageux près Villers (Bommer).
— *paniculata* L. — ♃ Mai-juin. Bords des eaux, Boisfort (Bommer).
— *panicea*. L. — ♃ Avril-Mai. Sapinière à Bonheyden.
— *Goodenowii*. Gay. — ♃ Avril-Mai. Bois tourbeux à Baisy-Thy (Dand).
— *limosa*. L. — ♃ Mai-juin. Fond tourbeux à Vossengat (H. Louis).
— *praecox*. Jacq. — ♃ Mars-avril. Laerbeek, Ganshoren, Rixensart (Bommer).
— *OEderi*. Thrh. — ♃ Mai-juin. Marais à Beggynendyk.
— *distans*. L. — ♃ Avril-Mai. Bois près de Perck (Bommer).
— *vesicaria* L. — ♃ Avril-Mai. Bords des fossés à Beggynendyck.
— *Pseudocyperus*. L. — ♃ Juin-juillet. Etang à Auderghem.
— *riparia*. Good. — ♃ Avril-mai. Étang à Groenendael (Bommer).
— *ampullacea*. Good. — ♃ Avril-mai. Marais à Beggynendyck.
— *paludosa*. Good. — ♃ Mai-juin. Var. : *Kochiana*. Étang à Groenendael (Bommer).
— *filiformis*. L. — ♃ Avril-mai. Fossés à Beggynendyck.

Schoenus. Lin.

Schoenus compressus L. — ♃ Juin-août. Endroits humides à La Hulpe.

Scirpus.

Scirpus setaceus. L. — Juin-août. Bords d'un ruisseau à Rosières (Bommer).

Cyperus.

Cyperus flavescens. L. — ⓘ Juin-août. Prairie tourbeuse à Uccle (Rottenburg).

Scirpus.

Scirpus setaceus. L. — ♃ Juin-août. Bords d'un ruisseau à Rosières (Bommer).
— *maritimus*. L. — ♃ Août. Fossés à Denderleeuw.
— *pauciflorus*. Lightf. S. Bœothryon. Endroits humides. Bonheyden.

RHYNCHOSPORA. Vahl.

Rynchospora alba. Vahl. Schœnus albus. L. — ♃ Juin-juillet Bord des fossés à Beggynendyck.

— *fusca*. Roem et Schult. Schoenus fuscus. L. — ♃ Juin-juillet. Même localité.

HELEOCHARIS. R. Br.

Heleocharis multicaulis. Dietr. Scirpus multicaulis. S. M. — ♃ Marécages à Beggynendyck.

ERIOPHORUM. Lin.

Eriophorum latifolium. Hoppe. — ♃ Avril-mai. Prairies spongieuses à Loupoigne (Dand.).

CLASSE XV. — SPADICÉES.

ACORINÉES. Fée.

ACORUS. Lin.

Acorus Calamus. L. — ♃ Juin-juillet. Bords des eaux Schoonhoven (Thiel).

TYPHACÉES. Juss.

TYPHA. Tourn.

Typha latifolia. L. — ♃ Juin-juillet. Bords des étangs environs de Bruxelles.

— *angustifolia*. L. — ♃ Juin-juillet. Canal de Willebroek au Pont-Brûlé (Wesmael).

SPARGANIUM. Tourn.

Sparganium minimum. Fries. — ♃ Juin-août. Fossés et mares à Beggynendyck.

Classe XVI. — DERMOGYNÉES.

EQUISETINÉES. Dec.

Equisetum. Lin.

Equisetum sylvaticum. L. — ♃ Avril-mai. Tervueren (Bommer).

OPHIOGLOSSINÉES. Comm. Bot.

Botrychium. Sw.

Botrychium Lunaria. Sw. — ♃ Juin. Jette (Piré) Dilighem (Bommer).

Ceterach. C. Bauh.

Ceterach officinarum. C. Bauh. — ♃ Mai-juin. Vieux murs à Grimberghen (Wesm.).

Asplenium. Lin.

Asplenium Adiantum-nigrum. L. — Coteaux boisés à Boitsfort et Linkebeek.

PILULARIACÉES.

Pilularia. Vaill.

Pilularia globulifera. L. — ♃ Lieux inondés, environs d'Aerschot.

LYCOPODINÉES. Beauv.

Lycopodium. L.

Lycopodium Chamaecyparissus. A Br. — Saint-Job (Wesm.).

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES FAMILLES ET DES GENRES.

A.

	Pages.		Pages.		Pages.
Acorus.	79	Anserina	58	Artemisia	64
Agrimonia	68	Antennaria	26	ASPARAGINÉES	73-42
Agrostis	77-76	Anthemis	64	Asparagus	*ib.*
Aira	76	Anthriscus	28	Asperula	65
Ajuga	20	Antirrhinum	61-21	Aspidium.	46
Alisma.	39	Aquilegia	71	Asplenium	80-*ib.*
ALISMACÉES	73-*ib.*	Arabis	72	Aster	65-66
Allium	74-43	Aristolochia	18	Astragalus	32
Alopecurus	77	Arnoseris.	26	Atriplex	18
Althaea	70	AROIDÉES	45	Atropa.	22
Alyssum	38	Arrhenatherum	43	Avena	44
Anemone	71-36				

B.

BALSAMINÉES	33	Betonica	20	Briza	76
Barbarea	38	Betula	17	Bromus	73-44
Barkhausia	63	BÉTULACÉES	*ib.*	Brunella	59
Batrachium	71	BORAGINÉES	62	Buda	33
BERBERIDÉES.	*ib.*	Botrychium	80	Bunias	38
Berberis	*ib.*	Brachypodium	73	Butomus	73

C.

Calamagrotis.	76	Callitriche	58	CAMPANULACÉES.	63-25
Calamintha	59	Camelina	72	Capnites	39
Calla	45	Campanula	63	Cardamine	71-28

Pages.
Carlina. 27
Caulinia 74
Carex 77-45
Centaurea. . . 65-27
Centunculus . . . 24
Cerastium. . . . ib.
Cerasus 68
Ceterach 80
Chénopodiacées. 58-18
Chenopodium . ib.-19
Cheiranthus . . . 72
Pages.
Cicendia 24
Cicuta 66
Circium 65-27
Cladium . . . . 44.
Cineraria 64
Claytonia 29
Comarum. . . . 31
Conifères . . . 17
Conium 28
Convolvulacées . 23
Pages.
Corydalis 39
Coronilla 68
Corrigiola. . . . 70
Corynephorus . . 76
Crataegus. . . . 30
Crepis 23
Crucifères . . 71-37
Cuscuta . . . 62-23
Cypérinées . . . 44
Cyperus 78

D.

Danthonia. . . . 76
Delia 35
Delphinium . . . 37
Deschampsia. . . 76
Dianthus 34
Digitalis 61
Digitaria 77
Dioscorées . . . 41
Dipsacées. . . . 65
Dipsacus 65
Doronicum . . . 64
Drosera 36
Droseracées . . ib.

E.

Endymion. . . . 74
Enodium 75
Epilobium . . 67-29
Epipactis 40
Équisétacées . 80-46
Equisetum . . 80-46
Eriophorum . . . 79
Erodium 70
Erysimum . . . 72
Erythraea. . . . 24
Euphorbia . . 69-29
Euphorbiacées . 69-ib.
Euphrasia. . . . 61
Evonymus . . . 69

F.

Festuca . . . 75-44
Filago 26
Fougères 46
Fragaria 31
Fritillaria. . . . 42
Fumaria . . . 72-38
Fumariacées. . ib. ib.

G.

Gagea 42
Galanthus. . . . 41
Galeopsis . . . 59-20
Galium. 66
Genista . . . 69-31
Gentiana 24
Gentianées . . . ib.
Géranidées . . 69-33
Geranium. . . ib. ib.
Glyceria 75
Gnaphalium . . . 27
Graminées . . 75-43
Grossulariacées 69-44
Gypsophila . . 70-ib.

H.

	Pages.		Pages.		Pages.
Haloragées	30	Hesperis	38	Hyosciamus	61-22
Heleocharis	79-45	Hieracium	63-26	Hydrocharis	73
Helichrysum	26	Hippuridées	18	Hydrocotyle	66
Helleborus	37	Hippuris	*ib.*	Hypericinées	70-34
Helminthia	26	Hordeum	44	Hypericum	*ib. ib.*
Helosciadium	28	Hottonia	62	Hypocheris	73-26
Herniaria	19				

I.

Illicinées	62	Illecebrum	19	Iridées	41
Ilex	*ib.*	Impatiens	33	Iris	*ib.*
Illécébrées	19	Inula	26	Isnardia	67

J.

Juncinées	74-43	Juncus?	74-43	Juniperus	57

K.

Kickxia	61

L.

Labiées	59-20	Lemnacées	74-45	Littorella	24
Luctuca	63	Lentibutariées	21	Lolium	43
Lappa	27	Leonurus	59-20	Loranthacées	28
Lamium	59	Leucoidées	41	Limosella	61
Larbraea	53	Leucoium	*ib.*	Lunaria	37
Lathyrus	68-32	Liliacées	74-42	Lycium	22
Lathraea	60	Limnanthemum	24	Lycopodium	80-46
Leersia	77	Linidées	53	Lycopsis	62
Légumineuses	68-45	Liparis	40	Lysimachia	*ib.*
Lemna	74-*ib.*	Lithosmermum	23	Lythrariées	30

M.

Malva	53	Medicago	51	Menyanthes	20
Malvacées	70-*ib.*	Melica	76	Mercurialis	69
Marrubium	59	Mentha	59-20	Mespilus	50

Pages.
Milium 77
Monotropa . . . 34
Monotropées . . ib.
Montia 60
Muscari 45
Myosostis . . . 62-25
Myosurus 71
Myrica 17
Myricées . . . . ib.
Myriophyllum . 67-30

N.

Narcissées . . . 73
Narcissus . . . . ib.
Nardus 77
Nasturtium . . . 38
Neottia 40
Nepeta 20
Nymphea 72
Nymphaeacées . . ib.

O.

Odontites 61
Oenanthe . . . 66-28
Oenothera . . . 29
Ombellifères . 66-28
Omphalodes . . . 23
Onagrariées . 67-29
Ophioglossinées 80-46
Ophioglossum . . ib.
Ophrys 40
Orchidées . . 73-39
Orchis . . . . ib. ib.
Ornithopus . . . 68
Orobus 32
Orobanche . . . 60
Osmunda 46
Oxalidées . . . 33
Oxalis . . . . . ib.

P.

Parietaria . . . 58-28
Parnassia 71
Pedicularis . . . 21
Peplis 30
Petasites 64
Peucedanum . . . 66
Phalacroloma . . 64
Pilularia 80
Pinus 17
Plantaginées . . 23
Plantago . . . . ib.
Platanthera . . . 40
Poa ? 76-43
Polygala . . . 21
Polygalées . . . ib.
Polygonées . . 58-19
Polygonum . . ib. ib.
Polypodium . . . 47
Polystichum . . . 46
Portutacées . . . 29
Potamogeton . 74-45
Potamogetonées . 45
Potentilla 31
Poterium 19
Primulacées . 62-24
Prismatocarpus . . 63
Prunus 30
Pulmonaria . . 62-23
Pyrola 70-34
Pyrolacées . . ib. ib.
Pyrus 30

Q.

Quercus 57

R.

Radiola 33
Ranunculacées . 71-36
Ranunculus . . . ib.
Reseda 35
Résédacées . . . ib.
Ribes 69
Rhamnidées . . . 69
Rhamnus . . . . ib.
Rosa . . . 67-68-31

Pages.
Rosacées . . . 67-30
Rhinanthidées . 61-21
Rhinanthus . . . ib.
Rubus 68
Ruscus. 73
Rudbeckia. . . . 64
Rumex. 58
Ryuschospora . . 79

S.

Sagina 70-35
Salicinées . . 57-17
Salix . . . . ib. ib.
Salvia 59
Samolinées . . . 66
Samolus . . . . ib.
Sanicula . . . . ib.
Sanguisorbées . . 19
Saponaria. . . . 70
Saxifraga 29
Saxifragées . . 67-ib.
Schoenus . . . 78-44
Scirpus. 78-44
Scolopendrium . . 47
Scrophularia. . 61-22
Scorzonera . . . 63
Scutellaria . . 59-20
Sedum. 67
Selinum . . . 66-28
Senecio . . . 64-26
Serratula 65
Senebiera. . . . 72
Setaria. 77
Silene 70
Sisymbrium . . . 58
Sium 66
Solanées . . . 61-22
Solanum . . . . ib.
Sparganium . . . 79
Spergula 35
Spiraea 68
Stellaria 35
Stellariacées . 70-34
Stratiotes 39
Synanthérées . 63-25

T.

Tamus. 41
Taraxacum . . . 63
Thalicthrum . . . 36
Thlaspi. . . . 72-37
Thymus 59
Tilia 33
Tiliacées. . . . 33
Torilis 28
Trapa 30
Trapacées . . . ib.
Trifolium . . . 68-32
Triglochin . . . 43
Triglochinées . . 43
Trisetum 76
Triticum 44
Tulipa 42
Typha 79
Typhacées . . . ib.

U.

Ulmidées 18
Ulmus . . . . ib.
Urticinées . . 58-18
Utricularia . . 60-21

V.

Valeriana 27
Valérianacées . 65-ib.
Valerianella . . . 65
Veronica . . . 61-21
Verbascinées . . 22
Verbascum . . . ib.
Vicia 32
Vinca 62
Violacées. . . . 71
Viola 71-36
Viscum 28
Vulpina 75

Z.

Zannichellia . . 74

New York Botanical Garden Library
QK 298 .M85 1862 fasc.1 gen
Muller, Felix/Spicilege de la flore brux
3 5185 00011 6275